AgroClass

Od fotosyntezy do ochrony biologicznej — zrozum procesy, które decydują o zdrowiu i produktywności roślin



Informacje o materiale

AgroClass

© 2026 AgroClass. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny.
Jego celem jest pomoc w zrozumieniu podstaw
fizjologii, żywienia i ochrony roślin.

Informacje przedstawione w AgroClass powinny być
interpretowane w kontekście konkretnej uprawy,
warunków środowiskowych oraz aktualnych zasad
dobrej praktyki rolniczej.

W przypadku stosowania środków ochrony roślin
należy zawsze przestrzegać aktualnej etykiety produktu,
obowiązujących przepisów oraz zaleceń właściwych
dla danego zastosowania.

Twoja droga przez AgroClass

Poznaj tematy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć rośliny i skuteczniej dbać o ich zdrowie oraz plonowanie.

Wprowadzenie 03

Moduł 01
Fotosynteza i energia rośliny 04

Moduł 02
Odżywianie mineralne roślin 12

Moduł 03
Woda, hormony i stres roślinny 21

Moduł 04
Chwasty i działanie herbicydów 30

Moduł 05
Choroby roślin 39

Moduł 06
Szkodniki rolnicze 48

Moduł 07
Ochrona biologiczna i integrowana 57

Słownik AgroClass 66

Mapa powiązań: roślina jako system 67

Sprawdź swoją wiedzę 68

Plan działania w praktyce 69

Nie ucz się tylko nazw. Zrozum, co dzieje się w roślinie.

Roślina nie funkcjonuje jako zbiór oddzielnych tematów. Fotosynteza wpływa na dostępność energii. Korzeń decyduje o pobieraniu wody i składników mineralnych. Warunki środowiska zmieniają tempo procesów fizjologicznych. A kondycja rośliny wpływa na jej reakcję na chwasty, choroby i szkodniki.

Dlatego w AgroClass będziemy łączyć fakty w jeden system.



Jak korzystać z AgroClass

1. **Zrozum mechanizm.**
   Najpierw odpowiedz sobie na pytanie: „dlaczego tak się dzieje?”.
2. **Zobacz zależności.**
   Łącz fizjologię roślin z tym, co obserwujesz w polu.
3. **Sprawdź się.**
   Po każdej lekcji zatrzymaj się przy pytaniu kontrolnym lub przykładzie.
4. **Wracaj do map myśli.**
   Po zrozumieniu tematu skrócona mapa staje się narzędziem szybkiego przypomnienia.

Cel nie brzmi: zapamiętać wszystko.
Cel brzmi: wiedzieć, co obserwować, jakie pytanie zadać i jak połączyć fakty.



MODUŁ 01

Fotosynteza i energia rośliny

Od światła do cukrów — skąd roślina bierze energię do wzrostu?



Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, czym naprawdę jest fotosynteza, gdzie zachodzi, jakie etapy obejmuje oraz dlaczego światło, CO_2, temperatura, woda i stan aparatu liściowego wpływają na jej intensywność.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić fotosyntezę prostymi słowami;
- wskazać rolę chloroplastów i chlorofilu;
- odróżnić fazę jasną od cyklu Calvina;
- rozumieć znaczenie ATP i NADPH bez nadmiernej biochemii;
- wymienić najważniejsze czynniki ograniczające fotosyntezę;
- połączyć spadek fotosyntezy z możliwymi konsekwencjami dla wzrostu roślin.

Warto zapamiętać

Fotosynteza łączy światło, wodę, CO_2 i działanie liścia w jeden proces wzrostu.

Pytanie kontrolne

Dlaczego niedobór jednego czynnika może ograniczyć cały proces?

Fotosynteza — fabryka energii rośliny

Fotosynteza pozwala roślinie wykorzystać energię światła do budowania związków organicznych z prostych substratów dostępnych w środowisku.

Roślina pobiera CO_2 głównie przez aparaty szparkowe liści, a wodę przede wszystkim przez system korzeniowy. Energia światła zostaje przechwycona przez barwniki fotosyntetyczne, w tym chlorofil. Dzięki kolejnym reakcjom roślina może wykorzystać węgiel z CO_2 do tworzenia związków organicznych.



$CO_2 + H_2O +$ energia świetlna $\longrightarrow$ związki organiczne $+ O_2$

To zapis poglądowy, a nie pełny opis wszystkich reakcji biochemicznych.

Dlaczego rolnika powinno to interesować?

- tworzenia nowych liści;
- rozwoju korzeni;
- budowy organów plonotwórczych;
- syntezy wielu związków potrzebnych roślinie.



Przykład praktyczny:

Jeżeli liście zostaną silnie uszkodzone przez grad, chorobę lub szkodniki, zmniejsza się aktywna powierzchnia zdolna do przechwytywania światła i wymiany gazowej. Potencjalną konsekwencją jest spadek produkcji asymilatów.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego utrata zielonej powierzchni liścia może wpłynąć na wzrost całej rośliny?

Chloroplast – miejsce, w którym światło uruchamia proces

Chloroplast można potraktować jak wyspecjalizowaną „mikrofabrykę” komórki roślinnej, w której różne etapy fotosyntezy zachodzą w różnych strukturach.



Chloroplast

organellum komórkowe związane z fotosyntezą.

Tylakoidy

struktury błoniaste, w których zachodzą reakcje zależne od światła.

Stroma

przestrzeń chloroplastu, w której zachodzą reakcje cyklu Calvina.



Chlorofil

Chlorofil to barwnik fotosyntetyczny zdolny do pochłaniania energii światła w określonych zakresach długości fali.

Miejsce → funkcja

Tylakoid	→	przechwytywanie energii świetlnej i powstawanie ATP/NADPH
Stroma	→	wykorzystanie ATP/NADPH do asymilacji węgla

Pytanie kontrolne:

Dlaczego rozdzielenie reakcji na różne części chloroplastu ma znaczenie dla organizacji procesu?

Faza jasna — zamiana energii światła na energię chemiczną

W fazie jasnej roślina nie „produkuje od razu cukru”. Najpierw przechwytuje energię światła i przekształca ją w formy możliwe do wykorzystania w dalszych reakcjach.

Proces zachodzi w błonach tylakoidów. Światło wzbudza elektrony w systemach fotosyntetycznych. Dochodzi do transportu elektronów i powstawania gradientu protonowego. Energia tego gradientu jest wykorzystywana do syntezy ATP. Powstaje również NADPH, który uczestniczy w przenoszeniu siły redukcyjnej do kolejnego etapu fotosyntezy. Rozkład wody dostarcza elektronów i wiąże się z uwalnianiem tlenu.



Wyjaśnienie terminów:

- **ATP** — cząsteczka służąca komórce jako łatwo dostępny nośnik energii.
- **NADPH** — cząsteczka przenosząca elektrony potrzebne w reakcjach redukcji.

Ważne!

Nie przedstawiaj ATP jako „magazynu energii na zawsze”.
To nośnik energii wykorzystywany w reakcjach komórkowych.

Pytanie kontrolne:

Które dwa produkty fazy jasnej są następnie wykorzystywane w cyklu Calvina?

Cykl Calvina —

wprowadzanie węgla do związków organicznych

Energia pozyskana ze światła zostaje wykorzystana do przekształcania węgla pochodzącego z CO_2 w związki organiczne.

Cykl Calvina zachodzi w stromie chloroplastu.

1. **Fiksacja węgla —** CO_2 zostaje przyłączony do związku akceptorowego przy udziale enzymu Rubisco.

2. **Redukcja —** ATP i NADPH z fazy jasnej dostarczają energii i elektronów potrzebnych do tworzenia bardziej zredukowanych związków węgla.

3. **Regeneracja akceptora CO_2 —** część produktów zostaje wykorzystana do odtworzenia związku potrzebnego do rozpoczęcia kolejnego obrotu cyklu.



Nie należy pisać, że cykl Calvina produkuje bezpośrednio glukozę. Powstają związki węglowe wykorzystywane później do syntezy różnych węglowodanów i innych metabolitów.



Przykład praktyczny:

Jeżeli aparaty szparkowe zamykają się z powodu niedoboru wody, dopływ CO_2 do wnętrza liścia może zostać ograniczony. To pokazuje, dlaczego gospodarka wodna i fotosynteza są ze sobą silnie powiązane.

Pytanie kontrolne:

Co może stać się z asymilacją CO_2, gdy roślina ogranicza wymianę gazową?

Fotosynteza nie działa w próżni – poznaj czynniki ograniczające

Tempo fotosyntezy zależy od wielu elementów jednocześnie. Zwiększenie jednego czynnika nie musi poprawić procesu, jeśli inny stał się już głównym ograniczeniem.

1 Światło



Przy zbyt małej ilości światła dostępna energia ogranicza proces. Po przekroczeniu określonego poziomu dalszy wzrost natężenia światła nie musi powodować proporcjonalnego wzrostu fotosyntezy.

2 CO_2

CO_2



Dostępność CO_2 wpływa na możliwość asymilacji węgla.



3 Temperatura



Reakcje enzymatyczne mają zakres temperatur sprzyjających ich przebiegowi. Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura może ograniczać tempo procesu.

4 Woda



Niedobór wody może prowadzić do zamykania aparatów szparkowych, ograniczać dopływ CO_2 i wywoływać dodatkowy stres metaboliczny.

5 Kondycja aparatu fotosyntetycznego



Niedobory składników pokarmowych, choroby, uszkodzenia liści i inne stresy mogą ograniczać zdolność rośliny do efektywnej fotosyntezy.

Czynniki działają razem. Diagnoza powinna szukać ograniczenia, a nie tylko objawu.



Przykład praktyczny:

Dwie rośliny otrzymują podobną ilość światła. Jedna ma odpowiednie uwodnienie, druga doświadcza suszy. Nie należy oczekiwać identycznej intensywności wymiany gazowej tylko dlatego, że warunki świetlne są takie same.

OBJAW
Zaobserwuj, co się dzieje z rośliną.

→

możliwe ograniczenie
Zastanów się, jaki czynnik może to powodować.

→

sprawdź warunki
Oceń światło, CO_2, temperaturę, wodę i kondycję rośliny.

→

połącz fakty
Wyciągnij wniosek i zaplanuj dalsze działania.

Na stronie 10 uczeń przechodzi z teorii do interpretacji konkretnych sytuacji w polu.

Jak rozpoznać, że fotosynteza może być ograniczona?

Nie obserwujemy fotosyntezy bezpośrednio gołym okiem, ale możemy obserwować warunki i objawy, które sugerują, że jej tempo może być ograniczone.

Naucz się rozróżniać cztery elementy: objaw, potencjalna przyczyna, mechanizm fizjologiczny i konsekwencja dla wzrostu rośliny.

Przypadek 1 — susza





Objaw:
liście tracą turgor, aparaty szparkowe mogą się zamykać.

Mechanizm:
mniejsza wymiana gazowa może ograniczać dopływ CO_2.

Możliwa konsekwencja:
spadek asymilacji węgla i wolniejszy przyrost biomasy.

Przypadek 2 — silne uszkodzenie liści



Objaw:
zmniejszona zielona powierzchnia asymilacyjna.

Mechanizm:
mniej aktywnej tkanki fotosyntetycznej.

Możliwa konsekwencja:
spadek ilości produktów fotosyntezy dostępnych dla rosnących organów.

Przypadek 3 — niedobór składników mineralnych



Objaw:
chlorozy, zahamowanie wzrostu lub nieprawidłowy rozwój liści.

Mechanizm:
zaburzone funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego, enzymów lub metabolizmu.

Możliwa konsekwencja:
obniżenie efektywności procesu.

Nie zgaduj po jednym objawie

Ta sama chloroza może mieć różne przyczyny. Dlatego obserwacja liścia powinna być połączona z oceną:

- stanowiska;
- wilgotności;
- rozkładu objawów;
- fazy rozwojowej;
- nawożenia;
- presji chorób i szkodników.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego żółknący liść nie oznacza automatycznie jednego konkretnego niedoboru?

Połącz fakty: fotosynteza jako system

Zamknij moduł, porządkując całą ścieżkę od światła do efektu widocznego w rozwoju rośliny.

Co wpływa na cały system?



woda

Dostępność wody wpływa na pracę aparatów szparkowych i przebieg reakcji fotosyntezy.



temperatura

Temperatura wpływa na szybkość reakcji enzymatycznych.



dostępność CO_2

Stężenie CO_2 w powietrzu wpływa na tempo wiązania węgla w cyklu Calvina.















kondycja liścia

Zdrowe liście z aktywnym aparatem fotosyntetycznym efektywniej przechwytują światło i wiążą CO_2.



składniki mineralne

Magnez, azot, fosfor, potas i inne pierwiastki są niezbędne do budowy chlorofilu, enzymów i przebiegu całego procesu.



stres biotyczny i abiotyczny

Choroby, szkodniki, susza, zasolenie, upał czy silne nasłonecznienie mogą ograniczać fotosyntezę.

5 rzeczy do zapamiętania:

1. Fotosynteza to proces wieloetapowy.
2. Faza jasna dostarcza ATP i NADPH.
3. Cykl Calvina wykorzystuje CO_2 do budowania związków węglowych.
4. Niedobór jednego czynnika może ograniczyć cały proces.
5. Kondycja aparatu fotosyntetycznego wpływa na potencjał wzrostu rośliny.

Mini-test:

1. **Gdzie zachodzi faza jasna?**
   a) w jądrze
   b) w błonach tylakoidów
   c) w ścianie komórkowej
2. **Jaki gaz jest źródłem węgla dla fotosyntezy?**
   a) O_2
   b) N_2
   c) CO_2
3. **Co może stać się podczas suszy?**
   a) aparaty szparkowe mogą się zamknąć
   b) zawsze rośnie pobieranie CO_2
   c) fotosynteza staje się niezależna od wody

Odpowiedzi: 1b, 2c, 3a.

Roślina może przechwytywać światło i asymilować węgiel, ale do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje również składników mineralnych. Teraz sprawdzimy, jak je pobiera i do czego ich używa.

MODUŁ 02

Odżywianie mineralne roślin

Składnik pokarmowy ma znaczenie dopiero wtedy, gdy roślina może go pobrać i wykorzystać.



Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, czym są składniki mineralne, jak docierają do korzeni, jakie pełnią funkcje oraz dlaczego obecność składnika w glebie nie oznacza automatycznie jego dostępności dla rośliny.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić różnicę między makro- i mikroelementami;
- wskazać podstawowe funkcje N, P, K, Mg, S i Ca;
- rozumieć rolę mikroelementów;
- wyjaśnić podstawowe mechanizmy transportu składników do korzeni;
- rozumieć wpływ pH na dostępność składników;
- analizować objawy niedoboru bez nadmiernego upraszczania diagnostyki.

Składniki mineralne — małe ilości, ogromne znaczenie

Roślina nie pobiera „nawozu”. Pobiera określone formy chemiczne pierwiastków, które następnie wykorzystuje w budowie tkanek i procesach metabolicznych.

Niezbędne pierwiastki mineralne można podzielić ze względu na ilość, jakiej potrzebuje roślina.

Makroelementy

potrzebne w relatywnie dużych ilościach.



azot | fosfor | potas | wapń | magnez | siarka

Mikroelementy

potrzebne w znacznie mniejszych ilościach, ale nadal niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania.



żelazo | mangan | cynk | miedź | bor | molibden | chlor | nikiel

„Mikro” oznacza mniejsze zapotrzebowanie ilościowe — nie mniejsze znaczenie biologiczne.

Każdy z pierwiastków pełni w roślinie określone funkcje, a jego niedobór może zaburzyć wzrost, rozwój i plonowanie, niezależnie od tego, czy jest to makroelement, czy mikroelement.



Roślina potrzebuje również węgla, wodoru i tlenu,

ale głównym źródłem tych pierwiastków są CO_2 i woda, a nie nawożenie mineralne w typowym rozumieniu.

Węgiel pochodzi z CO_2 pobieranego przez liście, a wodór i tlen z wody pobieranej przez korzenie.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego określenie „mikroelement” nie oznacza, że dany pierwiastek jest mało ważny?

Azot — kluczowy składnik wzrostu

Azot jest jednym z podstawowych pierwiastków budujących związki niezbędne do funkcjonowania i wzrostu rośliny.

Azot jest częścią:

- **aminokwasów**
  Buduje cegiełki białek.
- **białek**
  Tworzy struktury komórkowe i białka zapasowe.
- **enzymów**
  Jest składnikiem enzymów katalizujących reakcje metaboliczne.
- **kwasów nukleinowych**
  Wchodzi w skład DNA i RNA.
- **chlorofilu**
  Pośrednio – poprzez budowę struktur metabolicznych związanych z jego syntezą i funkcjonowaniem.



Niedobór azotu często prowadzi do:

- spowolnienia wzrostu;
- mniejszej powierzchni liści;
- jasnozielonego lub żółtawego zabarwienia;
- wcześniejszego starzenia się starszych liści.

Dlaczego często najpierw starsze liście?

Azot jest relatywnie mobilny w roślinie. W warunkach niedoboru może być przemieszczany ze starszych tkanek do młodszych, aktywnie rosnących organów.

Boks praktyczny:

Nie diagnozować niedoboru N wyłącznie na podstawie koloru. Podobne objawy mogą wynikać m.in. z: uszkodzeń korzeni, nadmiaru wody, suszy, niskiej temperatury, innych zaburzeń żywienia.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego niedobór składnika mobilnego może być bardziej widoczny na starszych liściach?

Fosfor — energia, błony i rozwój

Fosfor uczestniczy w procesach związanych z energią, budową komórek i przekazywaniem informacji genetycznej.

Fosfor jest składnikiem:

- **ATP** nośnika energii w komórkach.
- **kwasów nukleinowych (DNA i RNA)** odpowiedzialnych za informację genetyczną.
- **fosfolipidów błon komórkowych** budujących struktury komórki.
- **wielu związków pośrednich metabolizmu** uczestniczących w reakcjach biochemicznych.



Dlaczego fosfor jest tak ważny dla metabolizmu energii?

W cząsteczce ATP grupy fosforanowe uczestniczą w reakcjach przenoszenia energii i fosforylacji.

Objawy możliwego niedoboru:

- zahamowany rozwój;
- słabszy rozwój systemu korzeniowego;
- ciemniejsze zabarwienie liści;
- u niektórych gatunków pojawienie się odcieni purpurowych lub antocyjanowych.



Ważne:

Purpurowe zabarwienie nie powinno być automatycznie interpretowane jako jednoznaczny niedobór P.

Dostępność ≠ zawartość

W glebie może znajdować się fosfor, ale jego dostępność dla rośliny może być ograniczona przez warunki chemiczne gleby.



Pytanie kontrolne:

Dlaczego analiza zawartości pierwiastka w glebie nie zawsze mówi pełną prawdę o jego dostępności dla rośliny?

Potas – regulator gospodarki wodnej i pracy komórek

Potas nie jest głównym elementem budującym wiele dużych cząsteczek organicznych, ale pełni niezwykle ważną rolę regulacyjną.

Potas uczestniczy m.in. w:

- regulacji gospodarki wodnej;
- utrzymaniu potencjału osmotycznego;
- pracy aparatów szparkowych;
- aktywacji wielu enzymów;
- transporcie asymilatów;
- regulacji równowagi jonowej.





Połączenie z Modułem 01:

Aparaty szparkowe wpływają na wymianę gazową.
Potas uczestniczy w regulacji zmian turgoru komórek szparkowych.
Dlatego gospodarka potasem może pośrednio wpływać na relację między:



Możliwe objawy niedoboru:

- zahamowany wzrost;
- chlorozy lub nekrozy zaczynające się często od brzegów starszych liści;
- obniżona tolerancja na część stresów.



Ważne w praktyce:

Nie opisywać potasu jako „pierwiastka odporności".

Lepsze sformułowanie: prawidłowe zaopatrzenie w K wspiera procesy fizjologiczne, które wpływają na zdolność rośliny do funkcjonowania w warunkach stresowych.

Mg, S i Ca — trzy różne role, jeden sprawny organizm

Każdy składnik mineralny pełni określone funkcje. Nie istnieje jeden „najważniejszy” pierwiastek, który zastąpi wszystkie pozostałe.

MAGNEZ — Mg



Najważniejsze funkcje:

- centralny atom w cząsteczce chlorofilu;
- udział w aktywacji enzymów;
- znaczenie w metabolizmie energii i pracy rybosomów.

Mg → chlorofil → fotosynteza.

SIARKA — S



aminokwas siarkowy
(np. metionina)

Najważniejsze funkcje:

- składnik niektórych aminokwasów;
- udział w budowie białek;
- znaczenie w wielu związkach biologicznie aktywnych.

S → aminokwasy siarkowe → białka i metabolizm.

WAPŃ — Ca



Najważniejsze funkcje:

- stabilizacja struktur ścian i błon komórkowych;
- udział w sygnalizacji komórkowej;
- szczególnie ważny dla prawidłowego rozwoju młodych tkanek.

Ca → struktura + sygnalizacja + wzrost młodych organów.

Sekcja porównawcza:

Mg	stosunkowo mobilny.
S	mobilność zależna od gatunku i warunków, zwykle mniejsza niż N.
Ca	słabo mobilny w floemie.

Mobilność wpływa na miejsce pojawiania się objawów niedoboru.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego niedobór Ca może szczególnie silnie ujawniać się w młodych, intensywnie rosnących tkankach?

Mikroelementy – precyzyjni pomocnicy metabolizmu

Roślina potrzebuje mikroelementów w małych ilościach, ale wiele kluczowych enzymów i reakcji metabolicznych nie może funkcjonować prawidłowo bez ich udziału.

Fe — żelazo

Udział w procesach transportu elektronów i funkcjonowaniu enzymów.

Mn — mangan

Udział w fotosyntezie i aktywacji enzymów.

Zn — cynk

Udział w działaniu wielu enzymów i regulacji metabolizmu.

Cu — miedź

Udział w reakcjach oksydoredukcyjnych i pracy wybranych białek.

B — bor

Znaczenie dla ścian komórkowych, wzrostu i rozwoju tkanek.

Mo — molibden

Istotny m.in. dla enzymów związanych z metabolizmem azotu.

Zarówno niedobór, jak i nadmiar mikroelementu mogą być problemem.

To ważna różnica wobec prostego myślenia: „skoro coś jest potrzebne, więcej zawsze znaczy lepiej”.

Prawo optimum:

1. **Za mało** → funkcja ograniczona.
2. **Optimum** → prawidłowe funkcjonowanie.
3. **Za dużo** → możliwa toksyczność lub zaburzenie równowagi.



Pytanie kontrolne:

Dlaczego mikroelement może być jednocześnie niezbędny i toksyczny?

Droga składnika: z gleby do powierzchni korzenia

Składnik pokarmowy nie „wskakuje” automatycznie do korzenia. Najpierw musi znaleźć się w jego otoczeniu, a następnie zostać pobrany przez komórki.

1 Przepływ masowy

Składniki przemieszczają się wraz z wodą transportowaną w kierunku korzenia. Proces jest związany m.in. z pobieraniem wody przez roślinę i transpiracją.

2 Dyfuzja

Jony przemieszczają się z obszaru o wyższym stężeniu do obszaru o niższym stężeniu. Ma duże znaczenie dla składników, których stężenie przy powierzchni korzenia szybko spada wskutek pobierania.

3 Przechwytywanie przez korzeń

Rosnący korzeń i jego włośniki kontaktują się z nowymi powierzchniami gleby.



Ważna różnica:

Transport do korzenia ≠ transport przez błonę komórkową korzenia

Po dotarciu do powierzchni korzenia jon nadal musi zostać pobrany przez odpowiednie mechanizmy transportowe w błonie komórkowej.

Korzeń nie działa sam:

Tempo i skuteczność dostarczania składników do korzenia zależy od wielu czynników glebowych, w tym od:

- zawartości wody;
- pH;
- temperatura gleby;
- napowietrzenie;
- aktywność mikroorganizmów;
- rozwój systemu korzeniowego;
- właściwości fizyczne i chemiczne gleby.

Na stronie 20 należy wyjaśnić, dlaczego pH może zmienić dostępność składników nawet wtedy, gdy pierwiastek znajduje się w glebie.

pH gleby — niewidoczny regulator dostępności składników

Obecność pierwiastka w glebie nie oznacza jeszcze, że roślina może go łatwo pobrać. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego dostępność jest odczyn gleby.

Zmiana pH może wpływać na:

- rozpuszczalność związków mineralnych;
- formę chemiczną składnika;
- jego wiązanie przez kompleks sorpcyjny;
- aktywność mikroorganizmów;
- rozwój systemu korzeniowego;
- ryzyko niedoboru lub toksyczności wybranych pierwiastków.

Ważna zasada:

Nie istnieje jedno idealne pH dla każdej rośliny, każdej gleby i każdego składnika.

Zakres optymalny zależy m.in. od:

- gatunku;
- typu gleby;
- zawartości materii organicznej;
- nawożenia;
- warunków wodnych.

Dostępność wybranych składników w zależności od pH gleby

Schemat przedstawia ogólną tendencję zmian dostępności składników. Nie jest to dokładna tabela wyników.



*Odpowiednie pH zwiększa dostępność składników i sprzyja rozwojowi korzeni.



Przykład praktyczny:

W glebie może znajdować się odpowiednia całkowita ilość fosforu, ale jego część może być związana w formach słabo dostępnych dla korzeni. Podobnie przy niskim pH niektóre pierwiastki mogą stać się łatwiej dostępne, a inne trudniej dostępne.

Nie myl trzech rzeczy:

Zawartość całkowita
— ile pierwiastka znajduje się w glebie.

Forma dostępna
— jaka część może potencjalnie uczestniczyć w żywieniu rośliny.

Pobranie
— ile pierwiastka rzeczywiście trafia do rośliny.

Nie pytaj tylko: „ile tego składnika jest?”.
Zapytaj również: „czy warunki pozwalają roślinie go pobrać?”.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego dwa pola z podobną zawartością danego pierwiastka mogą różnić się pod względem jego dostępności dla roślin?

MODUŁ 03

Woda, hormony i stres roślinny

Roślina stale podejmuje fizjologiczne „decyzje”, jak dzielić wodę, energię i zasoby.



Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, jak woda przemieszcza się przez roślinę, czym jest transpiracja, jak działają aparaty szparkowe, jak hormony regulują wzrost oraz w jaki sposób roślina reaguje na stres środowiskowy.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić rolę wody w organizmie roślinnym;
- opisać podstawową drogę wody od gleby do atmosfery;
- rozumieć związek między transpiracją a wymianą gazową;
- wyjaśnić funkcję aparatów szparkowych;
- rozróżnić podstawowe role najważniejszych fitohormonów;
- wyjaśnić pojęcie stresu abiotycznego;
- analizować kompromis między wzrostem a przetrwaniem.

Woda — więcej niż tylko „napój” dla rośliny

Woda nie służy wyłącznie do uzupełniania wilgoci. Jest środowiskiem reakcji, uczestnikiem fotosyntezy, środkiem transportu i elementem decydującym o napięciu komórek.



1 Utrzymanie turgoru

Woda pomaga komórkom utrzymywać odpowiednie napięcie, dzięki któremu tkanki zachowują strukturę.



2 Transport

Wraz z wodą przemieszczają się składniki mineralne i liczne związki rozpuszczone.

H_2O =
struktura + transport + metabolizm + chłodzenie + fotosynteza

3 Fotosynteza



Woda jest jednym z substratów reakcji fotosyntetycznych.

4 Regulacja temperatury



Parowanie wody z powierzchni liści może pomagać w odprowadzaniu ciepła.



5 Środowisko reakcji metabolicznych

Większość procesów biochemicznych zachodzi w środowisku wodnym.

Turgor — ciśnienie wywierane przez zawartość komórki na jej ścianę, zależne m.in. od obecności wody.

Przykład praktyczny:

Roślina może mieć chwilowo dostępne światło i składniki mineralne, ale jeśli traci więcej wody, niż może pobrać, zaczyna ograniczać funkcje, które zwiększają dalszą utratę wody.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego niedobór wody może wpływać jednocześnie na wygląd rośliny, transport składników i fotosyntezę?

Od gleby do liścia — jak przemieszcza się woda?

Woda przechodzi przez ciąg elementów połączonych w jeden system: glebę, korzeń, tkanki przewodzące, liść i atmosferę.





5 Liść i atmosfera

Woda dociera do liści, a jej część przechodzi w stan pary i wydostaje się do atmosfery.



4 Ksylem

Ksylem, czyli drewno, transportuje wodę i rozpuszczone składniki mineralne głównie w kierunku części nadziemnych.



3 Tkanki korzenia

Woda przemieszcza się przez korzeń w kierunku tkanek przewodzących.



2 Powierzchnia korzenia

Włośniki zwiększają powierzchnię kontaktu korzenia z glebą.



1 Gleba

Woda znajduje się w porach gleby i może zawierać rozpuszczone jony mineralne.

Wyjaśnienie mechanizmu:

Transpiracja z liści pomaga utrzymać gradient napędzający przepływ wody przez ksylem. Nie opisywać procesu jako działania jednej „pompy".

Ważne:

Transport wody wynika z właściwości fizycznych wody, ciągłości słupa wody w ksylemie oraz różnic potencjału wody.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego parowanie wody z liścia może wpływać na transport wody z korzeni?

MODUŁ 02

Transpiracja — strata wody czy konieczny koszt?

Transpiracja oznacza utratę wody, ale jest również częścią systemu umożliwiającego wymianę gazową, transport i regulację temperatury.

Transpiracja to utrata wody w postaci pary z nadziemnych części rośliny, przede wszystkim przez aparaty szparkowe.



Na tempo transpiracji wpływają m.in.:

- temperatura;
- dostępność wody w glebie;
- wilgotność powietrza;
- powierzchnia liści;
- ruch powietrza;
- stopień otwarcia aparatów szparkowych.

APARAT SZPARKOWY OTWARTY



APARAT SZPARKOWY ZAMKNIĘTY



Kluczowy kompromis:

Aby pobierać CO_2 potrzebny do fotosyntezy, roślina otwiera aparaty szparkowe. Ale otwarcie aparatów zwiększa również możliwość utraty wody. Dlatego roślina nie może maksymalizować jednocześnie pobierania CO_2 i minimalnej utraty wody. Musi regulować oba procesy.

Najważniejsza zależność:

Oszczędzanie wody może mieć koszt w postaci ograniczenia fotosyntezy.

Przykład praktyczny:

W gorący, suchy dzień zapotrzebowanie atmosfery na wodę może być wysokie. Jeżeli korzenie nie nadążają z jej dostarczaniem, roślina może ograniczyć przewodnictwo szparkowe.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego zamknięcie aparatów szparkowych pomaga podczas suszy, ale jednocześnie może ograniczyć produkcję biomasy?

Aparaty szparkowe – małe struktury, wielka kontrola

Aparaty szparkowe są mikroskopijnymi „zaworami” liścia, które pomagają regulować wymianę gazową i utratę wody.

Aparat szparkowy tworzą komórki szparkowe otaczające por. Zmiana ich turgoru wpływa na stopień otwarcia szparki.



Gdy aparat jest bardziej otwarty:

- CO_2 łatwiej dyfunduje do wnętrza liścia;
- para wodna łatwiej wydostaje się na zewnątrz.

Gdy aparat się zamyka:

- spada utrata wody;
- ograniczana jest również wymiana gazowa.

Co wpływa na reakcję aparatów szparkowych?

- światło;
- stężenie CO_2;
- stan wodny rośliny;
- wilgotność powietrza;
- temperatura;
- sygnały hormonalne.

Połączenie z potasem:

Ruch jonów, w tym K^+, uczestniczy w regulacji potencjału osmotycznego komórek szparkowych. Zmiana zawartości substancji osmotycznie czynnych wpływa na ruch wody i turgor tych komórek.

Nie przedstawiać aparatu szparkowego jako świadomego „zaworu podejmującego decyzję”. W tekście można stosować uproszczenie dydaktyczne, ale wyjaśnić, że regulacja wynika z procesów fizjologicznych.

Pytanie kontrolne:

Jak otwieranie aparatów szparkowych łączy moduł o wodzie z wcześniejszym modułem o fotosyntezie?

Fitohormony – chemiczny system regulacji rośliny

Roślina nie ma układu nerwowego jak zwierzę, ale posiada rozbudowany system sygnałów chemicznych regulujących wzrost, rozwój i reakcje na środowisko.

Fitohormony to związki aktywne w bardzo małych stężeniach, które uczestniczą w regulacji procesów fizjologicznych.

Auksyny

- wydłużanie komórek;
- dominacja wierzchołkowa;
- tworzenie korzeni;
- reakcja na kierunek światła i grawitację.

Cytokininy

- podziały komórkowe;
- rozwój pędów;
- regulacja starzenia części tkanek.



Wierzchołek pędu

Młody pęd

Gibereliny

- wzrost wydłużeniowy;
- kiełkowanie;
- przejście niektórych roślin do kolejnych faz rozwojowych.

Kwas abscysynowy – ABA

Szczególnie ważny w reakcjach na niedobór wody i regulacji aparatów szparkowych.



Kiełkujące nasiono

Aparat szparkowy w liściu

Etylen

- dojrzewanie;
- starzenie;
- opadanie organów;
- reakcje na stres.

Dojrzewający owoc

Hormony nie działają pojedynczo.

Efekt fizjologiczny zwykle wynika z ich wzajemnych proporcji, miejsca działania i stanu rośliny.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego trudno przewidzieć reakcję rośliny, analizując tylko jeden hormon w oderwaniu od pozostałych?

Susza – jak roślina ogranicza straty i zmienia priorytety

Gdy dostępność wody spada, roślina zmienia sposób funkcjonowania, Jej priorytetem może stać się utrzymanie integralności tkanek zamiast maksymalnego tempa wzrostu.

Spadek dostępności wody



Mniej wody w glebie oznacza większy wysiłek rośliny, aby ją pobrać.

Zmiana stanu wodnego rośliny



Spada uwodnienie tkanek, obniża się turgor komórek i potencjał wodny rośliny.

Sygnały fizjologiczne i hormonalne



Roślina wytwarza i odbiera sygnały m.in. hormonalne (np. ABA), które uruchamiają odpowiedź na stres.

Zmiany w funkcjonowaniu aparatów szparkowych



Sygnały prowadzą do redukcji otwarcia aparatów szparkowych (w mniejszym lub większym stopniu).

Ograniczenie transpiracji



Mniej wody uchodzi z liści do atmosfery.

Możliwe ograniczenie fotosyntezy i wzrostu



Mniejszy dopływ CO_2 do liści może ograniczać tempo fotosyntezy, co często prowadzi do spowolnienia wzrostu.



Rola ABA:

W warunkach niedoboru wody wzrasta znaczenie sygnalizacji związanej z kwasem abscysynowym. ABA uczestniczy m.in. w procesach prowadzących do ograniczenia otwarcia aparatów szparkowych.

Inne możliwe reakcje:

- ograniczenie ekspansji liści;
- zmiana wzrostu korzeni;
- akumulacja związków osmotycznie czynnych;
- zmiana ekspresji genów stresowych;
- przyspieszone starzenie części organów przy silnym stresie.

Nie przedstawiać każdej reakcji jako uniwersalnej.

Jej nasilenie zależy od gatunku, fazy rozwojowej, szybkości narastania stresu i warunków środowiskowych.

Przykład praktyczny:

Dwie rośliny mogą doświadczać podobnej wilgotności gleby, ale reagować inaczej, jeśli mają różny system korzeniowy, znajdują się w innej fazie rozwojowej albo temperatura i wilgotność powietrza są różne.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego strategia oszczędzania wody może jednocześnie ograniczać tempo wzrostu?

MODUŁ 02

Stres abiotyczny

gdy środowisko wychodzi poza optimum

Stres abiotyczny pojawia się wtedy, gdy nieożywiony czynnik środowiska ogranicza prawidłowe funkcjonowanie rośliny.



Susza
niedobór dostępnej wody.

Zalanie i niedotlenienie
ograniczony dostęp tlenu do korzeni.

Wysoka temperatura
zaburzenia działania białek, błon i gospodarki wodnej.

Niska temperatura
spowolnienie metabolizmu i możliwe uszkodzenia struktur komórkowych.

Zasolenie
trudniejsze pobieranie wody oraz zaburzenia równowagi jonowej.

Nieprawidłowe pH
możliwe problemy z dostępnością składników i funkcjonowaniem korzeni.

Nadmiar promieniowania lub światła → możliwość powstania stresu oksydacyjnego, gdy energia pochłaniana przewyższa zdolność aparatu fotosyntetycznego do jej wykorzystania.

Stres oksydacyjny — stan, w którym produkcja reaktywnych form tlenu przewyższa możliwości systemów ochronnych komórki.

Schemat powstawania objawów stresu:



Podobny objaw może być końcowym efektem zupełnie różnych stresów.

Pytanie kontrolne:
Dlaczego zahamowanie wzrostu samo w sobie nie wystarcza do rozpoznania rodzaju stresu?

Połącz system:
woda, wymiana gazowa, hormony i stres

Pokazać, że gospodarka wodna nie jest osobnym zagadnieniem, ale centralnym elementem łączącym korzeń, fotosyntezę, odżywianie mineralne i reakcję na środowisko.

ABA
→ reakcja na niedobór wody

Kwas abscysynowy (ABA) wzmacnia zamykanie aparatów szparkowych i uruchamia szeroką reakcję stresową rośliny.

Temperatura
→ wpływ na parowanie i metabolizm

Wyższa temperatura zwiększa parowanie wody i przyspiesza procesy metaboliczne.



K+
→ regulacja turgoru komórek szparkowych

Jony potasu odpowiadają za zmiany turgoru komórek szparkowych, a tym samym za otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych.

Wilgotność
→ wpływ na gradient pary wodnej

Niższa wilgotność powietrza zwiększa gradient pary wodnej, co przyspiesza transpirację.

System korzeniowy
→ wpływ na możliwość pobierania wody

Rozbudowany system korzeniowy zwiększa objętość gleby, z której roślina może pobierać wodę i składniki mineralne.

5 rzeczy do zapamiętania:

1. Woda pełni funkcję strukturalną, transportową i metaboliczną.
2. Transpiracja i pobieranie CO_2 są fizjologicznie powiązane.
3. Aparaty szparkowe regulują kompromis między utratą wody a wymianą gazową.
4. Fitohormony koordynują wzrost, rozwój i reakcje stresowe.
5. Objaw stresu jest końcowym efektem procesu — nie zawsze wskazuje jednoznacznie przyczynę.

Mini-test:

1. Która tkanka przewodzi wodę głównie od korzeni do części nadziemnych?
   a) floem b) ksylem c) epidermis
2. Co może nastąpić podczas niedoboru wody?
   a) wzrost otwarcia aparatów szparkowych w każdej sytuacji
   b) ograniczenie przewodnictwa szparkowego
   c) całkowita niezależność fotosyntezy od CO_2
3. Który hormon jest silnie związany z reakcją rośliny na niedobór wody?
   a) ABA b) chlorofil c) celuloza
4. Czy więdnięcie zawsze oznacza niedobór wody w glebie?
   a) tak
   b) nie — trzeba ocenić cały system gleba–korzeń–roślina–atmosfera

Odpowiedzi: 1b, 2b, 3a, 4b.

Przejście do praktyki ochrony roślin:

Zdrowie rośliny zależy nie tylko od jej własnej fizjologii. Na polu musi ona również konkurować z innymi roślinami. Chwasty mogą przejmować: światło; wodę; przestrzeń; składniki mineralne. Dlatego następny moduł pokazuje, czym właściwie jest chwast, jak przebiega konkurencja oraz w jaki sposób herbicydy zakłócają konkretne procesy fizjologiczne.

MODUŁ 04 — Chwasty i działanie herbicydów

MODUŁ 04

Chwasty i działanie herbicydów

Nie wystarczy zniszczyć chwast. Trzeba rozumieć konkurencję, moment działania i mechanizm herbicydu.

Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, dlaczego chwasty ograniczają rozwój roślin uprawnych, czym różni się działanie różnych grup herbicydów, jak substancja aktywna dociera do miejsca działania oraz dlaczego błędy w stosowaniu zwiększają ryzyko nieskuteczności i selekcji odporności.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić, dlaczego chwasty konkurują z rośliną uprawną;
- rozumieć znaczenie momentu zachwaszczenia;
- odróżnić selektywność od skuteczności;
- opisać podstawowe drogi pobierania herbicydu;
- wyjaśnić różnicę między herbicydem kontaktowym a systemicznym;
- rozumieć pojęcie miejsca i mechanizmu działania;
- połączyć mechanizm działania z obserwowanymi symptomami;
- wyjaśnić, jak powstaje odporność herbicydowa;
- rozumieć znaczenie rotacji mechanizmów działania i metod niechemicznych.



CHWAST
Pojawia się w uprawie.

→

KONKURENCJA
O światło, wodę i składniki pokarmowe.

→

INTERWENCJA
Zastosowanie herbicydu we właściwym terminie.

→

MECHANIZM
Substancja aktywna dociera do miejsca działania i zakłóca procesy życiowe chwastu.

→

EFEKT
Zahamowanie wzrostu i obumarcie chwastu. Większy potencjał plonu rośliny uprawnej.

Chwast to nie gatunek.
To roślina w niewłaściwym miejscu.

Roślina staje się chwastem wtedy, gdy występuje tam, gdzie jej obecność koliduje z celem uprawy.

Konkurencja o światło

Rośliny rosnące szybciej lub wyżej mogą zacieniać roślinę uprawną.

Konkurencja o składniki mineralne

Szybko rozwijające się chwasty mogą intensywnie pobierać dostępne składniki.

Utrudnienie zbioru

Niektóre chwasty pogarszają warunki zbioru, zwiększają wilgotność materiału lub zanieczyszczają plon.



Konkurencja o wodę

Korzenie różnych gatunków korzystają z części tych samych zasobów wodnych.

Konkurencja o przestrzeń

Wysokie zagęszczenie chwastów ogranicza miejsce potrzebne do rozwoju rośliny uprawnej.

Funkcja żywiciela

Część chwastów może stanowić źródło pokarmu lub miejsce rozwoju dla patogenów i szkodników.

Nie każda obecność chwastu powoduje taki sam poziom strat.

O znaczeniu danego gatunku chwastu w uprawie decyduje wiele czynników, m.in.:

- gatunku;
- liczebności;
- terminu pojawienia się;
- fazy rozwoju uprawy;
- warunków środowiskowych;
- czasu trwania konkurencji.

Najgroźniejszy chwast to nie zawsze największa roślina.
Liczy się również moment i czas trwania konkurencji.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego ten sam gatunek chwastu może mieć różne znaczenie w dwóch różnych uprawach?

Moment ma znaczenie — kiedy chwasty są najbardziej kosztowne?

Roślina uprawna nie jest jednakowo wrażliwa na zachwaszczenie przez cały sezon. Istnieją okresy, w których konkurencja może szczególnie silnie ograniczać rozwój i potencjał plonowania.

Krytyczny okres konkurencji chwastów

część cyklu rozwojowego uprawy, w której zachwaszczenie powinno być szczególnie skutecznie kontrolowane, aby ograniczyć istotne straty.

Dlaczego wczesna konkurencja może być groźna?

- mały system korzeniowy;
- niewielka powierzchnia liści;
- dopiero buduje przewagę przestrzenną;
- często słabiej konkuruje o zasoby.



Ale:

Nie tworzyć zasady „im wcześniej oprysk, tym zawsze lepiej". Moment interwencji zależy także od:

- gatunków chwastów;
- fazy ich rozwoju;
- fazy rozwoju rośliny uprawnej;
- produktu;
- warunków aplikacji;
- strategii całego programu ochrony.

Przykład praktyczny — dwa pola, różna sytuacja

Pole A: chwasty pojawiają się razem z roślina uprawną.



Pole B: chwasty wschodzą po zamkięciu międzyrzędzi.



Na polu A konkurencja może rozpocząć się znacznie wcześniej.

Przebieg sezonu i okres zwiększonej wrażliwości



Pytanie kontrolne:

Dlaczego liczebność chwastów bez informacji o terminie ich pojawienia się nie wystarcza do oceny ryzyka?

Herbicyd ma zwalczać chwast, ale oszczędzać uprawę

Skuteczność i selektywność to dwa różne pytania. Pierwsze dotyczy chwastu, drugie bezpieczeństwa rośliny uprawnej.

Skuteczność herbicydu

zdolność zabiegu do ograniczenia lub zwalczenia chwastu.

Selektywność herbicydu

zdolność do zwalczania określonych chwastów przy akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej.

Skąd bierze się selektywność?

- różnic w pobieraniu substancji;
- różnic w transporcie;
- różnic w metabolizmie;
- różnej wrażliwości miejsca działania;
- terminu aplikacji;
- umiejscowienia środka w glebie;
- stosowania sejfnerów w wybranych formulacjach.

Sejfner — substancja zwiększająca tolerancję rośliny uprawnej na określony herbicyd, np. poprzez przyspieszenie jego detoksykacji.

Selektywność nie oznacza absolutnego braku możliwości uszkodzenia uprawy.

- nieodpowiednia faza rozwojowa;
- stres roślin;
- niewłaściwe warunki aplikacji;
- błędy dawkowania;
- nieprawidłowe mieszaniny.



dobra strategia = równowaga

Pytanie kontrolne:

Dlaczego herbicyd bardzo skuteczny wobec chwastu nie jest automatycznie dobrym rozwiązaniem dla każdej uprawy?

Jak herbicyd dostaje się do rośliny?

Zanim herbicyd zadziała w miejscu docelowym, musi zostać pobrany przez odpowiednią część rośliny i — jeśli jest to konieczne — przetransportowany wewnątrz jej tkanek.



Liście

- dotrzeć do powierzchni;
- utrzymać kontakt;
- przeniknąć przez kutykulę lub inne struktury;
- dostać się do tkanek.

Korzenie

Substancja dostępna w roztworze glebowym może być pobierana z wodą lub przez odpowiednie systemy transportowe.

Młode organy podczas kiełkowania

Niektóre herbicydy działają w strefie, przez którą przechodzą młode części kiełkującej rośliny.

Co wpływa na pobieranie nalistne?

- temperatura;
- wilgotność powietrza;
- warstwa woskowa;
- wielkość i wiek liścia;
- formulacja;
- pokrycie powierzchni;
- czas bez opadu po aplikacji.

Co wpływa na działanie doglebowe?

- wilgotność gleby;
- ilość materii organicznej;
- tekstura gleby;
- umiejscowienie substancji;
- opady;
- właściwości chemiczne substancji.

Brak pobrania oznacza brak możliwości dotarcia substancji do miejsca działania.

Pytanie kontrolne:
Dlaczego ten sam herbicyd nalistny może działać różnie przy bardzo niskiej i przy umiarkowanej wilgotności powietrza?

Kontaktowy czy systemiczny — co dzieje się po pobraniu?

Nie każdy herbicyd przemieszcza się w roślinie tak samo. To wpływa na tempo objawów, miejsce uszkodzeń i skuteczność wobec różnych typów chwastów.

Herbicyd kontaktowy

- działa głównie w tkankach, które zostały bezpośrednio pokryte i do których substancja wniknęła;
- ograniczona translokacja;
- duże znaczenie dokładnego pokrycia;
- często szybkie objawy w miejscu kontaktu.



KONTAKTOWY

Uszkodzenia widoczne są głównie na liściach i innych częściach rośliny, które zostały bezpośrednio opryskane.

Herbicyd systemiczny

Po pobraniu może być przemieszczany do innych części rośliny.

- ksylemem;
- floemem;
- obiema drogami, zależnie od właściwości substancji.



SYSTEMICZNY

Substancja może docierać do młodych tkanek, korzeni, stożków wzrostu i organów magazynujących.

Floem – co transportuje?

Floem transportuje produkty fotosyntezy i inne związki do organów będących miejscami ich zużycia lub magazynowania.

- młodych tkanek;
- korzeni;
- stożków wzrostu;
- organów magazynujących.



Ważna praktyczna uwaga

W przypadku chwastów wieloletnich z podziemnymi organami regeneracyjnymi sama nekroza liścia nie musi oznaczać całkowitego zniszczenia zdolności do odrastania.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego dobra translokacja może być szczególnie ważna przy zwalczaniu chwastów wieloletnich?

Herbicyd nie „zatruwa rośliny ogólnie” — uderza w konkretny proces

Herbicyd działa dlatego, że zakłóca określony proces biochemiczny lub fizjologiczny niezbędny do życia rośliny.

Miejsce działania

konkretny enzym, białko lub struktura, z którą oddziałuje substancja.

Mechanizm działania

sposób, w jaki to oddziaływanie zaburza funkcjonowanie rośliny.

Przykładowe procesy, które mogą być celem herbicydów:

- fotosynteza;
- synteza aminokwasów;
- synteza lipidów;
- tworzenie pigmentów;
- podziały komórkowe;
- regulacja wzrostu;
- integralność błon komórkowych.



Połączenie z wcześniejszymi modułami:

Jeżeli herbicyd blokuje proces fotosyntetyczny, uczeń powinien wrócić myślami do Modułu 01. Jeżeli zakłóca wzrost i podziały komórkowe, powinien połączyć to z fizjologią i hormonami.

Objaw może pojawić się z opóźnieniem, ponieważ najpierw zaburzony zostaje proces na poziomie komórkowym.

Od cząsteczki do całej rośliny — łańcuch działania herbicydu:



Pytanie kontrolne:

Dlaczego roślina może przestać rosnąć przed pojawieniem się wyraźnych przebarwień lub nekroz?

Objaw jest wskazówką, nie ostateczną diagnozą

Różne mechanizmy działania mogą powodować charakterystyczne wzorce uszkodzeń, ale sam wygląd rośliny nie zawsze wystarcza do jednoznacznej identyfikacji przyczyny.

Najczęstsze kategorie symptomów

Chloroza

Utrata zielonego zabarwienia wskutek spadku zawartości lub funkcjonowania pigmentów.



Nekroza

Obumarcie fragmentu tkanki.



Zahamowanie wzrostu

Roślina może przestać rozwijać nowe organy jeszcze przed silnymi zmianami barwy.



Deformacje

Nieprawidłowy kształt liści lub pędów może wskazywać na zaburzenia regulacji wzrostu.



Bielenie

Może wynikać z zaburzeń syntezy lub ochrony barwników.



Zaczerwienienie lub antocyjanowe przebarwienia

Mogą pojawiać się jako wtórna reakcja stresowa.



Zanim nazwiesz mechanizm:

1. gdzie pojawił się objaw;
2. które gatunki są uszkodzone;
3. kiedy wykonano zabieg;
4. jakie były warunki pogodowe;
5. czy objaw odpowiada historii pola;
6. czy możliwe są inne przyczyny.

Niedobór składnika, stres pogodowy, choroba i uszkodzenie herbicydowe mogą czasem wyglądać podobnie.

Pytanie kontrolne:
Dlaczego dobry diagnostyk łączy wygląd rośliny z historią zabiegu i warunkami środowiska?

Odporność — efekt selekcji, a nie „przyzwyczajenia się" chwastu

Odporność pojawia się wtedy, gdy w populacji istnieją osobniki zdolne przeżyć działanie herbicydu, a powtarzana presja selekcyjna zwiększa ich udział w kolejnych pokoleniach.

Nieprawidłowe uproszczenie:
„Chwasty przyzwyczaiły się do oprysku."

Poprawny model:
W populacji istnieje zmienność genetyczna. Niektóre osobniki mogą posiadać cechy umożliwiające przeżycie określonego mechanizmu działania.



Po zabiegu:

- osobniki wrażliwe giną;
- odporne przeżywają;
- przeżywające wydają nasiona;
- częstotliwość cechy odporności wzrasta.

Herbicyd nie tworzy odporności „na żądanie". Selekcjonuje osobniki, które już posiadają cechy dające przewagę.

Mechanizmy odporności mogą obejmować m.in.:

- zmianę miejsca działania;
- zwiększoną detoksykację substancji;
- ograniczenie transportu;
- zmiany w pobieraniu;
- nadprodukcję białka docelowego.

Co zwiększa presję selekcyjną?

- częste używanie tego samego mechanizmu działania;
- brak rotacji metod;
- uproszczony płodozmian;
- brak kontroli roślin, które przetrwały zabieg.

Strategia ograniczania odporności:
ROTACJA MECHANIZMÓW + METODY NIECHEMICZNE + MONITORING + OGRANICZANIE BANKU NASION

Zmiana nazwy handlowej preparatu nie oznacza automatycznie zmiany mechanizmu działania.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego stosowanie różnych produktów handlowych może nadal prowadzić do silnej presji selekcyjnej, jeśli mają ten sam mechanizm działania?

MODUŁ 05

Choroby roślin

Patogen sam nie wystarczy. Choroba rozwija się wtedy, gdy spotkają się podatny gospodarz, patogen i odpowiednie środowisko.



Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, czym jest choroba roślin, jakie grupy patogenów ją wywołują, jak przebiega infekcja oraz dlaczego warunki środowiskowe i faza rozwojowa rośliny są równie ważne jak sama obecność patogenu.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- odróżnić chorobę infekcyjną od uszkodzenia abiotycznego;
- rozpoznać główne grupy patogenów roślin;
- wyjaśnić koncepcję trójkąta chorobowego;
- opisać podstawowe etapy procesu infekcyjnego;
- rozumieć rolę wilgotności, temperatury i czasu;
- odróżnić objaw od oznaki etiologicznej;
- wyjaśnić podstawowe zasady profilaktyki;
- rozumieć, dlaczego fungicyd nie zastępuje diagnostyki.



Chwasty były przykładem konkurenta rośliny.

Teraz przechodzimy do organizmów, które mogą:

- kolonizować tkanki;
- pobierać zasoby;
- zaburzać fizjologię;
- prowadzić do uszkodzeń lub śmierci organów.

MODUŁ 05

Choroba powstaje z połączenia trzech elementów

Sama obecność patogenu nie oznacza jeszcze, że choroba rozwinie się na poziomie powodującym wyraźne objawy. Potrzebne jest spotkanie podatnej rośliny, zdolnego do infekcji patogenu i środowiska sprzyjającego procesowi chorobowemu.

Podatny gospodarz

Roślina musi znajdować się w stanie umożliwiającym infekcję.

- gatunek;
- odmiana;
- faza rozwojowa;
- kondycja fizjologiczna;
- uszkodzenia tkanek;
- poziom odporności genetycznej.

Patogen

Patogen musi:

- być obecny;
- pozostawać żywotny;
- znajdować się w odpowiednim stadium;
- mieć możliwość dotarcia do gospodarza.

Sprzyjające środowisko

Warunki muszą sprzyjać procesowi chorobowemu.

- temperatura;
- wilgotność;
- długość zwilżenia liścia;
- opady;
- zagęszczenie łanu;
- wentylacja między roślinami.

czas również wpływa na rozwój epidemii



Warto zapamiętać

Ochrona roślin nie zawsze polega na „zwalczaniu patogenu". Można również ograniczać jego źródło, zwiększać odporność gospodarza lub zmieniać warunki sprzyjające infekcji.

Przykład z praktyki

Patogen znajduje się na polu, ale warunki są zbyt suche dla infekcji. Obecność inokulum nie musi natychmiast prowadzić do rozwoju objawów.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego wykrycie patogenu nie zawsze oznacza, że choroba rozwinie się z dużą intensywnością?

MODUŁ 06

Nie każda choroba ma tego samego sprawcę

Podobne objawy mogą być wywoływane przez bardzo różne organizmy. Dlatego poprawna identyfikacja grupy patogenu jest podstawą dalszej diagnostyki.



GRZYBY

Jedna z najważniejszych grup patogenów roślin.

- plamistości
- zgorzele
- rdze
- mączniaki
- zgnilizny
- więdnięcia

Mogą wytwarzać zarodniki służące do rozprzestrzeniania.



LĘGNIOWCE

Organizmy grzybopodobne.

- zgorzele
- zgnilizny korzeni
- zarazy

Często silnie zależą od obecności wody lub wysokiej wilgotności.



BAKTERIE

Mogą wnikać przez naturalne otwory, zranienia lub miejsca uszkodzone.

- nekrozy
- plamy
- zgnilizny
- więdnięcia
- narośla



WIRUSY

Nie funkcjonują samodzielnie poza żywą komórką gospodarza.

- wektory
- materiał rozmnożeniowy
- kontakt mechaniczny



NICIENIE

Mikroskopijne zwierzęta pasożytnicze.

- korzenie
- łodygi
- liście
- nasiona

Nie stosować zbiorczego określenia „grzyb” dla wszystkich patogenów wywołujących plamy lub zgnilizny.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego podobny wygląd plamy na liściu nie wystarcza do określenia grupy patogenu?

MODUŁ 06

Od kontaktu do kolonizacji — etapy infekcji

Choroba nie pojawia się natychmiast po kontakcie patogenu z rośliną. Zanim zobaczymy objawy, zwykle zachodzi kilka kolejnych etapów.

Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć kolejne etapy procesu infekcji roślin przez patogeny, powiązać je z warunkami środowiskowymi i rozumieć, dlaczego objawy choroby pojawiają się z opóźnieniem.



1 Inokulum dociera do rośliny

- zarodnik;
- komórka bakterii;
- cząstka wirusa przeniesiona przez wektor;
- forma przetrwalnikowa patogenu.

2 Kontakt z odpowiednią powierzchnią

- liść;
- korzeń;
- łodyga;
- kwiat;
- owoc;
- miejsce zranienia.

3 Kiełkowanie lub aktywacja

W odpowiednich warunkach patogen rozpoczyna proces umożliwiający infekcję.

4 Penetracja

- bezpośrednio przez powierzchnię;
- przez aparaty szparkowe;
- przez inne naturalne otwory;
- przez rany.

5 Kolonizacja

Patogen rozwija się w tkankach gospodarza.

6 Objawy i dalsze rozprzestrzenianie

Uszkodzenia tkanek stają się widoczne, a część patogenów zaczyna produkować nowe inokulum.

Okres inkubacji

— czas od infekcji do pojawienia się widocznych objawów.

To, co widzimy dzisiaj na liściu,

może być skutkiem infekcji, która rozpoczęła się kilka dni wcześniej.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego warunki pogodowe sprzed kilku dni mogą być ważniejsze dla diagnozy niż pogoda w dniu zauważenia objawów?

MODUŁ 06

Pogoda może otworzyć lub zamknąć „okno infekcji”



Mokra powierzchnia liścia to większe ryzyko infekcji

Patogen ma własne wymagania środowiskowe. Infekcja jest bardziej prawdopodobna wtedy, gdy temperatura, wilgotność i czas utrzymania sprzyjających warunków występują razem.

Wilgotność

- sprzyjać kiełkowaniu zarodników;
- zwiększać przeżywalność inokulum;
- wydłużać okres zwilżenia powierzchni roślin.

Zwilżenie liścia

- jak długo liść pozostawał mokry;
- w jakiej temperaturze;
- czy zwilżenie było ciągłe.

Temperatura

- minimalnych;
- optymalnych;
- maksymalnych dla określonego procesu.

Optimum dla kiełkowania nie musi być identyczne z optimum dla późniejszej kolonizacji.

Model w praktyce

ODPOWIEDNIA TEMPERATURA

+

ODPOWIEDNIA WILGOTNOŚĆ

+

WYSTARCZAJĄCY CZAS

↓

WIĘKSZE PRAWDOPODOBIEŃSTWO INFEKCJI



Czas

Nawet sprzyjająca temperatura może nie wystarczyć, jeśli odpowiednie warunki utrzymują się zbyt krótko.



Przykład z praktyki

Dwie noce mogą mieć taką samą temperaturę, ale różnić się ryzykiem infekcji, jeżeli podczas jednej liście były suche, a podczas drugiej pozostawały mokre przez wiele godzin.

Ważne

Nie interpretować modelu jako uniwersalnego równania. Wymagania są specyficzne dla patogenu.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego sama informacja o ilości opadu nie wystarcza do pełnej oceny ryzyka choroby?

MODUŁ 06

Co robi roślina, a co możemy zobaczyć po patogenie?

Objaw i oznaka etiologiczna to nie to samo. Rozróżnienie obu pojęć pomaga prowadzić dokładniejszą diagnostykę.

OBJAW

To reakcja lub zmiana w roślinie spowodowana procesem chorobowym.

Przykłady:

- chloroza;
- nekroza;
- więdnięcie;
- deformacja;
- zahamowanie wzrostu;
- zgnilizna.



OZNAKA

To widoczny element związany bezpośrednio ze sprawcą.

Przykłady:

- grzybnia;
- zarodniki;
- owocniki;
- śluz bakteryjny w określonych przypadkach;
- struktury przetrwalnikowe.



OBJAW = odpowiedź gospodarza lub efekt uszkodzenia
OZNAKA = fizyczna obecność struktury lub materiału sprawcy.

Warto pamiętać

Chloroza jest bardzo niespecyficzna. Może wynikać z choroby, niedoboru, uszkodzenia herbicydowego, stresu wodnego lub zaburzenia korzeni. Dlatego sama chloroza nie identyfikuje patogenu.

Przy obserwacji zapytać:

- gdzie zaczynają się objawy?
- czy występują na całym polu czy placowo?
- które organy są zajęte?
- czy można znaleźć oznaki sprawcy?
- jak objawy rozwijają się w czasie?

Pytanie kontrolne:
Dlaczego obecność charakterystycznej oznaki może mieć większą wartość diagnostyczną niż sama chloroza?

MODUŁ 06

Patogen nie pojawia się znikąd — poznaj cykl chorobowy

Aby skutecznie ograniczać chorobę, warto znaleźć etap, w którym można przerwać cykl życia lub rozprzestrzeniania patogenu.



1. Przetrwanie

- w glebie;
- na resztkach pożniwahinożniwnych;
- na nasionach;
- w żywych roślinach;
- na chwastach lub roślinach samosiewnych;
- w organizmie wektora.



2. Produkcja inokulum

W odpowiednich warunkach powstają struktury zdolne rozpocząć infekcję.



PRZETRWANIE

STOP



NOWE INOKULUM



INOKULUM



3. Rozprzestrzenianie

- wiatr;
- krople deszczu;
- gleba;
- materiał roślinny;
- narzędzia;
- człowiek;
- wektory biologiczne.

STOP



ROZPRZESTRZENIANIE



KOLONIZACJA



5. Kolonizacja i objawy

Rozwija się w tkankach.

STOP



INFEKCJA

STOP



4. Infekcja

Patogen wnika do gospodarza.



6. Produkcja kolejnego inokulum

W przypadku chorób wielocyklicznych proces może powtarzać się wiele razy w jednym sezonie.



Ważne pojęcia

Choroba monocykliczna — ma zasadniczo jeden dominujący cykl infekcji w sezonie.

Choroba policykliczna — może tworzyć kolejne pokolenia inokulum i wielokrotnie infekować rośliny w tym samym sezonie.



Warto zapamiętać

Najlepszym miejscem interwencji nie zawsze jest moment, w którym objawy są już najbardziej widoczne.



Pytanie kontrolne:

Dlaczego choroba policykliczna może rozwijać się bardzo szybko po pojawieniu się pierwszych ognisk?

MODUŁ 06

Najlepsza ochrona zaczyna się przed pojawieniem objawów

Skuteczna ochrona przed chorobami powinna łączyć kilka metod. Fungicyd jest jednym z narzędzi, a nie całym systemem ochrony.

Odporność odmianowa

Wybór odmiany o odpowiednim poziomie odporności może ograniczać podatność gospodarza.

Zdrowy materiał siewny

Ogranicza ryzyko wprowadzenia części patogenów razem z materiałem rozmnożeniowym.

Ochrona chemiczna lub biologiczna

Powinna być elementem programu opartego na ryzyku, biologii sprawcy, terminie, mechanizmie działania i aktualnych zaleceniach.

Płodozmian

Może ograniczać populację patogenów silnie związanych z określonym gospodarzem.

Warunki łanu

Odpowiednia obsada, nawożenie i architektura łanu mogą wpływać na mikroklimat.

Zarządzanie resztkami pożniwnymi

Ma znaczenie wtedy, gdy resztki stanowią istotne miejsce przetrwania patogenu.



ODPORNOŚĆ + AGROTECHNIKA + MONITORING + HIGIENA + OCHRONA CELOWANA

↓

NIŻSZA PRESJA CHOROBY

Ważne:

Unikać przekazu, że pojedyncza praktyka „eliminuje” chorobę.

Myśl epidemiologicznie

Każda metoda powinna odpowiadać na pytanie: Który element trójkąta lub cyklu chorobowego właśnie modyfikuję?

Pytanie kontrolne:

Dlaczego odmiana odporna, płodozmian i monitoring mogą wzajemnie się uzupełniać zamiast konkurować ze sobą jako strategie?

MODUŁ 06

Od patogenu do epidemii — połącz cały proces

Choroba jest procesem dynamicznym, a skuteczna diagnostyka wymaga połączenia biologii sprawcy, podatności gospodarza, warunków środowiska i czasu.

ŹRÓDŁO PATOGENU

Patogen przetrwą w resztkach roślinnych, glebie, nasionach, roślinach żywicielskich lub wodzie.



INOKULUM

Zarodniki, komórki lub inne formy zdolne do rozpoczęcia infekcji.



SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKO

Odpowiednia wilgotność, temperatura, czas zwilżenia i inne warunki.



INFEKCJA PODATNEGO GOSPODARZA

Patogen wnika do tkanek rośliny przez naturalne otwory lub rany.



KOLONIZACJA

Patogen rozwija się w tkankach rośliny i zajmuje nowe komórki.



OBJAWY / OZNAKI

Pojawiają się widoczne symptomy (chore tkanki) oraz oznaki (np. nalot, zarodniki).



NOWE INOKULUM

Na chorych tkankach powstają nowe formy rozprzestrzeniania patogenu (np. zarodniki).



DALSZE INFEKCJE

Nowe inokulum rozprzestrzenia się i powoduje kolejne infekcje, co prowadzi do rozwoju epidemii.



5 rzeczy do zapamiętania:

1. Choroba infekcyjna wymaga kontaktu gospodarza, patogenu i sprzyjającego środowiska.
2. Objaw nie jest tym samym co oznaka obecności patogenu.
3. Infekcja może rozpocząć się znacznie wcześniej niż pojawią się widoczne symptomy.
4. Wilgotność, temperatura i czas często wspólnie tworzą okno infekcji.
5. Najskuteczniejsza strategia ochrony łączy działania profilaktyczne, monitoring i właściwie dobrane interwencje.

Mini-test:

1. Który element NIE należy do klasycznego trójkąta chorobowego?
   a) podatny gospodarz
   b) sprzyjające środowisko
   c) cena środka ochrony
   d) patogen

2. Nekroza liścia jest przede wszystkim:
   a) objawem
   b) zawsze zarodnikiem
   c) nazwą patogenu

3. Dlaczego okres zwilżenia liścia jest istotny?
   a) dla części patogenów wpływa na możliwość infekcji
   b) zawsze blokuje infekcję
   c) nie ma związku z chorobami

4. Co oznacza choroba policykliczna?
   a) patogen nie produkuje kolejnego inokulum
   b) w sezonie mogą występować kolejne cykle infekcji
   c) choroba występuje tylko raz w historii pola

Odpowiedzi: 1c, 2a, 3a, 4b.

Przejście do następnego modułu:

Patogeny wykorzystują roślinę jako gospodarza. Szkodniki natomiast mogą zjadać tkanki, wysycać soki, uszkadzać korzenie, niszczyć organy generatywne i przenosić patogeny.

W kolejnym module uczeń nauczy się patrzeć na owada nie tylko przez pytanie: „Co to za gatunek?" ale również: „Jak żeruje, kiedy jest niebezpieczny i czy jego liczebność uzasadnia interwencję?"

MODUŁ 06

Szkodniki rolnicze

Obecność owada nie zawsze oznacza szkodę — kluczowe są gatunek, faza rozwoju, liczebność i moment żerowania.

Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, czym jest szkodnik w kontekście rolniczym, jak rodzaj aparatu gębowego wpływa na charakter uszkodzeń, dlaczego znajomość cyklu życiowego jest podstawą monitoringu oraz kiedy liczebność organizmu staje się problemem ekonomicznym.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- odróżnić obecność organizmu od poziomu szkodliwości;
- rozpoznawać podstawowe typy uszkodzeń;
- połączyć aparat gębowy z charakterem żerowania;
- rozumieć znaczenie cyklu rozwojowego szkodnika;
- wyjaśnić pojęcie monitoringu;
- rozumieć próg ekonomicznej szkodliwości;
- odróżnić szkodnika od organizmu pożytecznego;
- wyjaśnić podstawowe zasady integrowanej ochrony przed szkodnikami.



USZKODZENIA LIŚCI

Ubytek tkanki, przegryzione otwory, wygryzione brzegi.

USZKODZENIA SSĄCE

Odbarwienia, deformacje, zahamowanie wzrostu, przenoszenie wirusów.

USZKODZENIA KORZENI

Podgryzanie korzeni, spadek pobierania wody i składników pokarmowych.

USZKODZENIA ORGANÓW GENERATYWNYCH

Zjadanie pąków, kwiatów, ziaren, spadek plonu i jakości.

ROZPOZNAJ → **MONITORUJ** → **OCEŃ RYZYKO** → **INTERWENIUJ TYLKO WTEDY, GDY JEST TO UZASADNIONE**

MODUŁ 05

Nie każdy owad na polu jest wrogiem

Szkodnik to organizm, którego aktywność może powodować straty w uprawie. O znaczeniu nie decyduje jednak sama obecność pojedynczego osobnika.

Gatunek

Różne organizmy uszkadzają roślinę w inny sposób.

- zjadają liście;
- wysysają soki;
- żerują w łodygach;
- atakują korzenie;
- uszkadzają kwiaty, nasiona lub owoce.



Stadium rozwojowe szkodnika

Nie każde stadium żeruje równie intensywnie.

W części gatunków to larwa odpowiada za większość uszkodzeń, podczas gdy postać dorosła pełni inną funkcję biologiczną.



Faza rozwojowa rośliny

Ten sam poziom uszkodzeń może mieć różne znaczenie w zależności od fazy rozwojowej rośliny.

- wschody;
- okres intensywnego wzrostu;
- tworzenie organów plonotwórczych.



Liczebność i tempo wzrostu populacji

Kilka osobników może nie powodować strat ekonomicznych. Szybko rosnąca populacja w kluczowej fazie rozwojowej może już stanowić zagrożenie.



OBECNOŚĆ ≠ SZKODA EKONOMICZNA



OBECNOŚĆ → IDENTYFIKACJA + LICZEBNOŚĆ + FAZA ROŚLINY + CZAS

- → MONITORUJ
- → ROZWAŻ INTERWENCJĘ

Zanim podejmiesz decyzję:

- jaki to organizm?
- w jakim jest stadium?
- która część rośliny jest uszkadzana?
- ile osobników występuje?
- jaka jest faza rozwojowa uprawy?
- czy populacja rośnie?
- czy obecni są naturalni wrogowie?

Na tym samym polu mogą występować:

- drapieżcy;
- parazytoidy;
- zapylacze;
- organizmy neutralne.



Działanie bez identyfikacji może niepotrzebnie eliminować również organizmy korzystne dla agroekosystemu.

Przykład praktyczny:

Pojedyncza kolonia owadów ssących na kilku roślinach nie powinna być automatycznie traktowana tak samo jak szybko zwiększająca się populacja występująca w dużej części plantacji.



Pytanie kontrolne:

Dlaczego decyzja o zwalczaniu nie powinna wynikać wyłącznie z faktu znalezienia szkodnika na roślinie?

Na stronie 50 uczeń nauczy się odczytywać sposób żerowania na podstawie aparatu gębowego i charakteru uszkodzeń.

MODUŁ 06

Sposób żerowania zostawia ślady

Budowa aparatu gębowego wpływa na sposób żerowania szkodnika, dlatego wzór uszkodzeń na roślinie może być pierwszą wskazówką co do prawdopodobnej grupy sprawców.

Aparat gryzący

Typowe ślady:

- dziury w liściach,
- wygryzione brzegi,
- szkieletyzacja blaszki,
- przecięte lub uszkodzone młode organy.

Przykładowe grupy:
gąsienice, larwy części chrząszczy, dorosłe chrząszcze, niektóre prostoskrzydłe.



TYP USZKODZENIA
Dziury w liściach, wygryzione brzegi

PRAWDOPODOBNY SPOSÓB ŻEROWANIA
Żerowanie gryzące

Aparat kłująco-ssący

Typowe ślady:

- punktowe odbarwienia,
- żółknięcie,
- deformacje,
- zwijanie liści,
- spadź,
- osłabienie wzrostu.

Przykładowe grupy:
mszyce, skoczki, mączliki, część pluskwiaków.



TYP USZKODZENIA
Punktowe odbarwienia, żółknięcie

PRAWDOPODOBNY SPOSÓB ŻEROWANIA
Żerowanie kłująco-ssące

Żerowanie minujące

Larwa rozwija się wewnątrz liścia, tworząc charakterystyczny tunel lub minę, widoczną jako jasna, nieregularna plama z wyraźnym przebiegiem chodnika.



TYP USZKODZENIA
Miny w liściu (tunele, jasne plamy)

PRAWDOPODOBNY SPOSÓB ŻEROWANIA
Żerowanie minujące (wewnątrz liścia)

Żerowanie wewnątrz organów

Szkodnik żeruje wewnątrz tkanek rośliny, np. w łodygach, pędach, owocach lub nasionach. Z zewnątrz może być widoczny tylko otwór wnikania lub inne pośrednie objawy.

Przykładowe miejsca:
łodygi, pędy, owoce, nasiona.



TYP USZKODZENIA
Otwór wnikania w łodydze (lub inne pośrednie objawy)

PRAWDOPODOBNY SPOSÓB ŻEROWANIA
Żerowanie wewnątrz organów (roślina od środka)

ŁAŃCUCH DIAGNOSTYCZNY

USZKODZENIE
Obserwuj i opisz rodzaj uszkodzeń na roślinie.

→

SPOSÓB ŻEROWANIA
Na podstawie śladów wnioskuj o sposobie żerowania.

→

POTENCJALNA GRUPA SZKODNIKA
Zawęź listę możliwych grup sprawców.

→

IDENTYFIKACJA
Potwierdź obserwacje innymi metodami (np. monitoringiem).

Warto pamiętać!

Brak widocznego owada nie oznacza braku szkodnika.
Sprawdź dolną stronę liści, wnętrze organów, glebę i strefę korzeniową.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego rodzaj uszkodzenia może zawęzić listę potencjalnych sprawców, ale nie powinien samodzielnie kończyć diagnostyki?

MODUŁ 06

Żeby dobrze monitorować szkodnika, trzeba wiedzieć, kiedy pojawia się jego groźne stadium

Najbardziej widoczne stadium rozwojowe nie zawsze jest tym, które powoduje największe straty. Różne stadia mogą różnić się wyglądem, miejscem występowania, sposobem odżywiania i wrażliwością na metody ochrony.

Przeobrażenie zupełne

Larwa i owad dorosły mogą wyglądać zupełnie inaczej, żyć w różnych miejscach i odżywiać się innym pokarmem.





Przykładowe grupy:
motyle, chrząszcze, muchówki, błonkówki.

Przeobrażenie niezupełne

Nimfa zwykle przypomina mniejszą wersję owada dorosłego, choć jej wymagania pokarmowe i środowiskowe mogą się nieco różnić.





Przykładowe grupy:
część pluskwiaków, prostoskrzydłe.

Dlaczego cykl życiowy jest ważny dla ochrony?

Znajomość cyklu rozwojowego pozwala określić:

- moment monitoringu,
- miejsce poszukiwania organizmu,
- stadium najbardziej szkodliwe,
- stadium najbardziej wrażliwe na określoną metodę ochrony,
- liczbę pokoleń w sezonie.

Pokolenie

Pełny cykl rozwoju prowadzący od jednego stadium reprodukcyjnego do kolejnego.

Nie należy zakładać, że wszystkie gatunki mają tylko jedno pokolenie w roku.

Przykład praktyczny:

Jeżeli największe szkody powoduje młoda larwa, monitoring samych owadów dorosłych może służyć jako sygnał zbliżającego się ryzyka, ale nie jest równoznaczny z aktualnym poziomem uszkodzeń.



Pytanie kontrolne:

Dlaczego znajomość terminu pojawu osobników dorosłych może być użyteczna nawet wtedy, gdy to larwa uszkadza roślinę?

MODUŁ 06

Najpierw zmierz problem, potem podejmij decyzję

Monitoring zamienia przypadkową obserwację w informację, która może być wykorzystana w procesie podejmowania decyzji.

Monitoring powinien odpowiadać na cztery pytania:

1 Co występuje?

Prawidłowa identyfikacja organizmu.



2 Ile tego jest?

Ocena liczebności lub intensywności występowania.



3 Gdzie występuje?

- jest punktowy,
- znajduje się na obrzeżu,
- obejmuje całe pole,
- koncentruje się w określonej strefie.



4 Jak sytuacja zmienia się w czasie?

Pojedyncza obserwacja pokazuje tylko stan chwilowy, natomiast seria obserwacji pozwala zidentyfikować trend.



Podstawowe metody monitoringu

- lustracja roślin,
- liczenie osobników,
- ocena procentu zasiedlonych roślin,
- ocena poziomu uszkodzeń,
- czerpakowanie,
- pułapki,
- tablice lepowe,
- obserwacja jaj lub larw,
- analiza korzeni lub gleby.



Zamiast pojedynczej obserwacji – szukaj trendu



Ważne!

Metoda monitoringu musi być dobrana do biologii konkretnego szkodnika.

W praktyce pamiętaj, że dane z monitoringu powinny być zapisywane razem z:

- datą,
- lokalizacją,
- fazą rozwojową uprawy,
- liczbą obserwacji,
- warunkami pogodowymi,
- obecnością pożytecznych organizmów.

Przykładowa karta monitoringowa

DATA	FAZA ROŚLINY	SZKODNIK	LICZEBNOŚĆ	USZKODZENIA	WROGOWIE NATURALNI	TREND

Pytanie kontrolne:

Dlaczego trzy obserwacje wykonane w odstępie czasu mogą być cenniejsze niż jedna dokładna lustracja?

MODUŁ 06

Pułapka pokazuje aktywność — nie zawsze bezpośrednio skalę szkody

Pułapki to narzędzia do monitoringu. Wyniki odłowów należy zawsze interpretować w kontekście biologii szkodnika, fazy rozwojowej rośliny oraz danych z pola.

Tablice lepowe

Pomagają monitorować aktywność organizmów latających. Kolor pułapki może wpływać na to, jakie organizmy są do niej przyciągane.



Pułapki feromonowe

Wykorzystują sygnał chemiczny do przyciągania określonej grupy lub płci owadów. Są przydatne do:

- wykrycia początku lotu;
- obserwacji dynamiki odłowów;
- wspierania decyzji o terminie dalszego monitoringu.



Pułapki świetlne

Wykorzystują reakcję niektórych owadów na światło.



Pułapki gruntowe

Służą do monitorowania aktywności organizmów poruszających się po powierzchni gleby.



ODŁÓW ≠ AUTOMATYCZNIE LICZBA SZKODNIKÓW NA ROŚLINIE

Na wynik pułapki wpływają również:

- pogoda,
- lokalizacja,
- konstrukcja pułapki,
- atraktant,
- aktywność owada,
- termin obserwacji.



LEPOWA



FEROMONOWA



ŚWIETLNA



GRUNTOWA

PUŁAPKA → INFORMACJA O AKTYWNOŚCI → WERYFIKACJA NA POLU → DECYZJA

Przykład praktyczny:
Zwiększony odłów motyli w pułapce feromonowej może sygnalizować początek bardziej intensywnego lotu, ale nie oznacza automatycznie, że określona liczba larw już żeruje na każdej roślinie.

Nigdy nie interpretuj liczby odłowionych osobników bez znajomości tego, co dokładnie mierzy dana metoda.

Pytanie kontrolne:
Dlaczego nagły wzrost odłowów może być sygnałem do intensywniejszej lustracji, a nie automatyczną komendą wykonania zabiegu?

MODUŁ 06

Kiedy szkoda uzasadnia koszt interwencji?

Integrowana ochrona roślin nie polega na eliminowaniu każdego szkodnika, lecz na utrzymaniu jego populacji poniżej poziomu powodującego ekonomicznie nieakceptowalne straty.

Poziom szkody ekonomicznej

To poziom populacji szkodnika lub rozmiar uszkodzeń, przy którym wartość strat staje się porównywalna z kosztem ich ograniczenia.

Próg ekonomicznej szkodliwości

To poziom populacji szkodnika lub nasilenia uszkodzeń, przy którym należy rozważyć podjęcie działań odpowiednio wcześnie, aby zapobiec osiągnięciu poziomu szkody ekonomicznej.

Uproszczony model podejmowania decyzji

NISKA LICZEBNOŚĆ
monitoring

→

POPULACJA ROŚNIE
częstszy monitoring

→

PRÓG DECYZYJNY
rozważ uzasadnioną interwencję

→

POZIOM SZKODY EKONOMICZNEJ
straty stają się ekonomicznie istotne

Przebieg wzrostu populacji szkodnika



Co wpływa na próg?

- potencjał plonowania,
- wartość plonu,
- koszt ochrony,
- faza rozwojowa,
- zdolność rośliny do kompensacji uszkodzeń,
- tempo wzrostu populacji,
- aktualne zalecenia dla gatunku i uprawy.

Ważne!

Nie należy podawać jednego, uniwersalnego, liczbowego progu ekonomicznej szkodliwości bez określenia:

- o jakiego szkodnika chodzi,
- w jakiej uprawie,
- jaką metodą liczono liczebność lub uszkodzenia,
- w jakiej fazie rozwojowej rośliny,
- na podstawie jakiego źródła zaleceń.

Próg nie odpowiada na pytanie „czy szkodnik istnieje?”, lecz „czy jego poziom uzasadnia działanie?”.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego celem integrowanej ochrony nie jest zawsze doprowadzenie liczebności szkodnika do zera?

MODUŁ 06

Na polu istnieje również armia sprzymierzeńców

Populacja szkodnika nie rośnie w izolacji. Może być ograniczana przez drapieżniki, parazytoidy oraz mikroorganizmy chorobotwórcze dla owadów.

Drapieżcy

Zabijają i zjadają wiele ofiar w ciągu swojego życia. Wśród nich są:

- biedronkowate,
- larwy złotooków,
- część biegaczowatych,
- drapieżne pluskwiaki,
- pająki.



Parazytoidy

Ich stadium rozwojowe rozwija się na lub wewnątrz pojedynczego gospodarza i zwykle prowadzi do jego śmierci. Najczęściej są to:

- błonkówki,
- część muchówek.



Entomopatogeny

To mikroorganizmy zdolne do wywoływaniaz choroby u owadów. Mogą należeć do nich:

- grzyby,
- bakterie,
- wirusy,
- wybrane nicienie entomopatogeniczne.



KLUCZOWE RÓŻNICE

Drapieżnik → konsumuje wiele ofiar

Parazytoid → rozwija się kosztem konkretnego gospodarza

Patogen owada → powoduje chorobę



Dlaczego są ważni?

- ograniczać tempo wzrostu populacji,
- opóźniać przekroczenie progu,
- utrzymywać populację poniżej poziomu ekonomicznie szkodliwego.

Ich skuteczność zależy od:

- jego liczebności,
- stadium,
- liczby ofiar,
- warunków środowiskowych,
- tempa wzrostu populacji szkodnika.

Przed zastosowaniem szeroko działającego środka warto sprawdzić, czy na plantacji występuje znacząca populacja organizmów pożytecznych.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego zabieg bardzo skuteczny wobec szkodnika może w niektórych sytuacjach zakłócić naturalną regulację jego populacji?

MODUŁ 06

Od znalezienia owada do właściwej decyzji

Ta strona łączy identyfikację, monitoring, próg ekonomicznej szkodliwości i organizmy pożyteczne w jeden praktyczny model podejmowania decyzji w ochronie roślin.

Krok po kroku do decyzji

Przejdź przez kolejne pytania, aby ocenić sytuację w polu i wybrać racjonalne działanie.

ZNALEZIONO ORGANIZM



Obserwuj uważnie i pobierz próbkę w razie wątpliwości.

IDENTYFIKACJA



Ustal gatunek. W razie potrzeby skorzystaj z klucza lub atlasu.

JAKIE STADIUM?



Określ stadia rozwojowe szkodnika.

JAK ŻERUJE?



Rozpoznaj typ uszkodzeń związany z aparatem gębowym.

JAKA JEST LICZEBNOŚĆ?



Policz organizmy na roślinach lub w próbkach.

CZY POPULACJA ROŚNIE?



Porównuj wyniki z kolejnych obserwacji – szukaj trendu.

JAKA JEST FAZA UPRAWY?



Uwzględnij wrażliwość rośliny w danym stadium rozwojowym.

CZY SĄ WROGOWIE NATURALNI?



Oceń obecność drapieżników, parazytoidów i innych organizmów pożytecznych.

PORÓWNAJ Z PROGIEM



Zestaw liczebność z progiem ekonomicznej szkodliwości.

MONITORUJ / INTERWENIUJ



Podejmij decyzję i kontynuuj monitoring.

6 rzeczy do zapamiętania:

1. Sama obecność szkodnika nie oznacza jeszcze szkody ekonomicznej.
2. Rodzaj aparatu gębowego pomaga interpretować wzorzec uszkodzeń.
3. Stadium najbardziej widoczne nie zawsze jest stadium najbardziej szkodliwe.
4. Monitoring powinien pokazywać trend, a nie tylko pojedynczy punkt w czasie.
5. Próg ekonomicznej szkodliwości wspiera racjonalną decyzję o interwencji.
6. Wrogowie naturalni są częścią systemu regulującego populację szkodników.

Mini-test:

Sprawdź, czy dobrze zrozumiałeś kluczowe zagadnienia z modułu. Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

1. Co oznacza próg ekonomicznej szkodliwości?

a) moment znalezienia pierwszego owada
b) poziom wspierający decyzję o interwencji przed wystąpieniem ekonomicznie istotnych strat
c) obowiązek całkowitego usunięcia populacji

2. Który organizm zabija zwykle wiele ofiar w ciągu życia?

a) drapieżnik
b) parazytoid rozwijający się w jednym gospodarzu
c) roślina żywicielska

3. Co może pokazać regularny monitoring?

a) trend populacji
b) wyłącznie kolor owada
c) gwarancję wystąpienia strat

4. Czy wysoki odłów w pułapce zawsze oznacza natychmiastową konieczność zabiegu?

a) tak
b) nie — wynik wymaga interpretacji w kontekście biologii i obserwacji pola.

Odpowiedzi: 1b, 2a, 3a, 4b.

Co dalej?

Do tej pory poznaliśmy trzy grupy problemów: chwasty, patogeny, szkodniki. Kolejny krok to połączenie metod biologicznych, agrotechnicznych, fizycznych i chemicznych w system, który nie reaguje automatycznie na każdy problem, lecz zarządza ryzykiem.

MODUŁ 07 — Ochrona biologiczna i integrowana

MODUŁ 07

Ochrona biologiczna i integrowana

Najlepsza ochrona nie opiera się na jednym narzędziu — buduje system, który ogranicza presję zanim problem wymknie się spod kontroli.

Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, czym jest ochrona biologiczna, jak działają organizmy pożyteczne oraz w jaki sposób metody biologiczne łączą się z monitoringiem, profilaktyką, agrotechniką i racjonalnym stosowamiem środków ochrony roślin.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić pojęcie ochrony biologicznej;
- rozróżnić ochronę zachowawczą, augmentatywną i klasyczną;
- opisać rolę drapieżców, parazytoidów i mikroorganizmów;
- rozumieć, że skuteczność metody biologicznej zależy od środowiska;
- wyjaśnić podstawową koncepcję integrowanej ochrony roślin;
- łączyć metody profilaktyczne, biologiczne, agrotechniczne i chemiczne;
- rozumieć znaczenie selektywności zabiegów wobec organizmów pożytecznych;
- budować prosty schemat decyzyjny IPM.

BIOLOGIA

Wykorzystanie organizmów pożytecznych.

- drapieżcy;
- parazytoidy;
- mikroorganizmy (np. grzyby, bakterie);
- ochrona zachowawcza, augmentatywna i klasyczna.



AGROTECHNIKA

Tworzenie niekorzystnych warunków dla szkodników.

- płodozmian;
- odmiany odporne;
- właściwe terminy siewu;
- zrównoważone nawożenie;
- uprawa roli i higiena pola.





OCHRONA CELOWANA

Stosowanie środków tylko gdy jest to uzasadnione.

- selektywność wobec organizmów pożytecznych;
- dobór odpowiednich substancji i terminów;
- ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.



MONITORING

Regularna obserwacja i ocena ryzyka.

- lustracje w polu;
- pułapki i sygnalizacją;
- określanie progów szkodliwości;
- podejmowanie decyzji na podstawie danych.



INTEGRACJA > POJEDYNCZE NARZĘDZIE

MODUŁ 07

Ochrona biologiczna — wykorzystaj relacje, które już istnieją w przyrodzie

Ochrona biologiczna wykorzystuje żywe organizmy lub ich działanie biologiczne w celu ograniczenia liczebności szkodników i innych niepożądanych organizmów.

Cel modułu

Uczeń ma zrozumieć, jak różne organizmy pożyteczne – drapieżniki, parazytoidy, mikroorganizmy i nicienie – mogą być wykorzystywane w ochronie roślin oraz od czego zależy skuteczność ochrony biologicznej.

Po tym module uczeń powinien umieć:

- wyjaśnić, na czym polega ochrona biologiczna;
- rozróżnić główne grupy organizmów pożytecznych;
- wskazać przykłady ich zastosowania w agrotechnice;
- ocenić czynniki wpływające na skuteczność metod biologicznych;
- wyjaśnić, dlaczego skuteczność zależy od warunków środowiska i prawidłowego zastosowania;
- zintegrować metody biologiczne z innymi elementami ochrony roślin;
- unikać uproszczonych wniosków dotyczących stosowania organizmów pożytecznych.

Drapieżców

Aktywnie wyszukują i konsumują ofiary.

Przykłady:

- biedronki;
- złotooki;
- roztocza drapieżne;
- pluskwiaki drapieżne.



Mikroorganizmy

Wybrane bakterie, grzyby, wirusy i inne mikroorganizmy mogą ograniczać określone agrofagi.

Przykłady:

- *Bacillus thuringiensis* (bakterie);
- *Beauveria bassiana* (grzyby);
- wirusy owadzie (np. MNPV).

Nicienie entomopatogeniczne

Wybrane gatunki nicieni mogą wykorzystywać owady jako żywicieli.

Przykład:

- *Steinernema sp.* i *Heterorhabditis sp.*



Termin „biologiczny" nie oznacza automatycznie, że:

- metoda działa natychmiast;
- działa w każdych warunkach;
- jest całkowicie nieselektywna wobec innych organizmów;
- może być stosowana bez właściwej diagnozy.

Skuteczność zależy od:

- prawidłowej identyfikacji celu;
- temperatury;
- wilgotności;
- liczebności agrofaga;
- stadium szkodnika;
- momentu zastosowania;
- przeżywalności organizmu biologicznego;
- kompatybilności z innymi zabiegami.

WŁAŚCIWY ORGANIZM
+
WŁAŚCIWY CEL
+
WŁAŚCIWY MOMENT
+
SPRZYJAJĄCE WARUNKI

SZANSA NA SKUTECZNĄ KONTROLĘ BIOLOGICZNĄ

Pytanie kontrolne:

Dlaczego nawet bardzo skuteczny organizm biologiczny może działać słabo, jeśli zostanie zastosowany w niewłaściwych warunkach?

MODUŁ 07

Nie ma jednej ochrony biologicznej — są różne strategie

Organizmy pożyteczne można wykorzystywać na różne sposoby. Możemy chronić te, które już występują w agroekosystemie, zwiększać ich liczebność albo wprowadzać nowego naturalnego wroga w określonym systemie.

1 Ochrona zachowawcza

Cel: chronić i wspierać wrogów naturalnych już występujących w agroekosystemie.

Przykłady działań:

- ograniczanie niepotrzebnych zabiegów szeroko działających;
- stosowanie bardziej selektywnych metod;
- utrzymywanie odpowiednich siedlisk;
- ochronę źródeł pokarmu dla organizmów pożytecznych;
- uwzględnianie ich obecności podczas podejmowania decyzji.



2 Ochrona augmentatywna

Cel: zwiększyć liczebność organizmu pożytecznego poprzez jego dodatkowe wprowadzenie.

Na czym polega?

- masowe uwalnianie;
- okresowe zwiększanie populacji.

Często stosowana tam, gdzie warunki można stosunkowo dobrze kontrolować, np. w uprawach pod osłonami (szklarnie, tunele).



3 Klasyczna ochrona biologiczna

Cel: wprowadzenie i trwałe ustanowienie odpowiednio przebadanego naturalnego wroga przeciwko określonemu organizmowi inwazyjnemu lub problemowemu.

Na czym polega?

- bardzo dokładna ocena bezpieczeństwa;
- znajomość ekologii organizmu;
- kontrola regulacyjna;
- analiza wpływu na organizmy niedocelowe.

To nie jest działanie, które można samodzielnie przeprowadzić. Wymaga specjalistycznych badań i odpowiednich procedur.



CHROŃ ZACHOWAWCZA → **WZMACNIAJ** AUGMENTATYWNA → **WPROWADŹ I USTANÓW** KLASYCZNA → **OGRANICZENIE PRESJI AGROFAGA**

Strategia	Co robimy?	Główny cel
Zachowawcza	Chronimy istniejących sprzymierzeńców	Wzmocnienie naturalnej regulacji
Augmentatywna	Dodajemy organizmy pożyteczne	Szybsze zwiększenie presji na agrofaga
Klasyczna	Wprowadzamy dobranego naturalnego wroga	Długoterminowa regulacja określonego problemu

Ochrona biologiczna to **zarządzanie relacją między organizmami** — nie po prostu zastąpienie preparatu chemicznego „preparatem biologicznym".

Pytanie kontrolne:

Która strategia ochrony biologicznej polega przede wszystkim na ochronie organizmów pożytecznych, które już znajdują się na polu?

Na stronie 60 należy pokazać, dlaczego środowisko, temperatura, wilgotność i kompatybilność z innymi zabiegami decydują o tym, czy kontrola biologiczna rzeczywiście zadziała.

MODUŁ 07

Biologia działa tylko wtedy, gdy środowisko jej na to pozwala

Organizm wykorzystywany w biologicznej ochronie roślin jest żywym elementem systemu. Jego skuteczność zależy od temperatury, wilgotności, dostępności gospodarza/ofiary oraz kompatybilności z innymi działaniami w uprawie.

1. Temperatura



Wpływa na przeżywalność, rozwój, rozmnażanie oraz aktywne poszukiwanie gospodarza lub ofiary. Poza optymalnym zakresem aktywność organizmu może znacznie spadać, a nawet całkowicie ustać.

Przykład:
W niskiej temperaturze drapieżne roztocza są mniej aktywne i wolniej się rozwijają.

2. Wilgotność



Ma kluczowe znaczenie szczególnie dla niektórych grzybów entomopatogenicznych, wybranych mikroorganizmów oraz stadiów wrażliwych na przesuszenie (np. jaj, młodych larw, nimf). Zbyt niska wilgotność może ograniczyć przeżywalność i skuteczność.

Przykład:
Grzyby entomopatogeniczne najlepiej działają przy podwyższonej wilgotności powietrza lub na wilgotnej powierzchni liści.



3. Stadium agrofaga

Metoda biologiczna może działać najlepiej tylko na określone stadium szkodnika, np. jaja, młode larwy, nimfy, poczwarki lub osobniki dorosłe. Różne stadia różnią się wrażliwością na działanie organizmu pożytecznego.



Przykład:
Niektóre nicienie są najskuteczniejsze w zwalczaniu larw w glebie.

4. Liczebność populacji

Biologiczna ochrona często działa najlepiej, gdy organizm pożyteczny zostanie wprowadzony wcześnie, przy niskiej liczebności szkodnika. Jeśli populacja agrofaga jest już bardzo wysoka, naturalny wróg może działać zbyt wolno, aby zauważalnie ograniczyć szkody.



Przykład:
Drapieżne pluskwiaki najskuteczniej ograniczają wciornastki, gdy pojawiają się one w niewielkiej liczbie.

5. Kompatybilność z innymi zabiegami

Niektóre zabiegi ochrony roślin, nawożenia lub adiuwanty mogą wpływać na przeżywalność, aktywność, rozmnażanie i utrzymanie się organizmów pożytecznych w środowisku. Ważne jest, aby dobrać środki i terminy zabiegów tak, by nie ograniczać ich działania.

Przykład: Niektóre insektycydy mogą silnie ograniczać populacje drapieżnych roztoczy, dlatego warto sprawdzić ich selektywność.



Warto pamiętać!

„Biologiczny" nie oznacza „niezależny od warunków".
Im lepiej rozumiesz biologię organizmu pożytecznego, tym lepiej możesz przewidzieć jego skuteczność.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego zastosowanie właściwego organizmu pożytecznego w niewłaściwym momencie może dać słaby efekt?

MODUŁ 07

IPM — zarządzanie problemem, a nie automatyczna reakcja

Zintegrowana ochrona roślin (IPM) łączy różne metody, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia szkodników i innych agrofagów, jednocześnie racjonalnie wykorzystując dostępne narzędzia.

IPM — Integrated Pest Management

to zintegrowane zarządzanie agrofagami, czyli świadome łączenie metod biologicznych, agrotechnicznych, mechanicznych, fizycznych, hodowlanych i chemicznych w celu ograniczenia szkodliwości organizmów, przy zachowaniu opłacalności i ochronie środowiska.

1 Profilaktyka

Twórz warunki, które ograniczają rozwój problemu, np. prawidłowy płodozmian, odpowiedni dobór odmian, właściwa agrotechnika i higiena pola.

2 Monitoring

Regularnie sprawdzaj, co dzieje się w uprawie. Obserwuj rośliny, stosuj pułapki i inne metody monitoringu, aby wcześnie wykryć zagrożenia.

3 Identyfikacja

Ustal, z jakim organizmem lub zaburzeniem masz do czynienia (np. szkodnik, choroba, chwast, niedobór). Wykorzystuj klucze, atlasy i konsultacje ze specjalistami.

4 Ocena ryzyka

Oceń, czy problem rzeczywiście wymaga działania. Weź pod uwagę próg szkodliwości, fazę rozwojową roślin i możliwe straty.

5 Dobór metody

Wybierz metodę lub kombinację metod, dostosowaną do biologii agrofaga i sytuacji w uprawie. Priorytet mają rozwiązania najmniej uciążliwe dla środowiska.

6 Ocena skuteczności

Po wykonaniu interwencji sprawdź, czy działanie przyniosło oczekiwany efekt. Oceń wyniki i w razie potrzeby skoryguj strategię.



Możliwe metody IPM:

- **agrotechniczne** (np. płodozmian, uprawa, termin siewu)
- **mechaniczne** (np. zbiór ręczny, pułapki, siatki)
- **fizyczne** (np. temperatura, światło, mulczowanie)
- **biologiczne** (np. organizmy pożyteczne, biopreparaty)
- **hodowlane** (np. odmiany odporne)
- **chemiczne** (środki ochrony roślin stosowane racjonalnie)

Ważne:

IPM nie oznacza „nigdy nie stosuj chemii".

IPM oznacza „stosuj właściwe narzędzie tylko wtedy, gdy ma uzasadnienie i jest częścią całej strategii".

Celem jest skuteczna ochrona roślin, a nie rezygnacja z dostępnych narzędzi.

Najlepsza decyzja może czasem brzmieć:

„jeszcze nie interweniuj — obserwuj".

Czasem najlepszym rozwiązaniem jest odczekanie, zebranie dodatkowych informacji i ponowna ocena sytuacji.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego brak zabiegu może być prawidłową decyzją w systemie IPM?

MODUŁ 07

Zacznij od podstaw, nie od ostatniego narzędzia

Im wcześniej ograniczysz ryzyko wystąpienia problemu, tym mniej później może być potrzebnych interwencji.

Zintegrowane podejście

Ochrona roślin jest najskuteczniejsza, gdy łączy różne metody. Piramida pokazuje kolejność myślenia i działania – od zapobiegania, przez monitoring, po metody niechemiczne i chemiczne.

MNIEJ INTERWENCJI W PRZYSZŁOŚCI

WIĘKSZA ODPORNOŚĆ SYSTEMU

OCHRONA CHEMICZNA



- Stosowana wtedy, gdy jest uzasadniona
- Właściwa dla celu
- W prawidłowym terminie
- Bezpieczna
- Pasuje do całego programu ochrony

METODY NIECHEMICZNE



- Mechaniczne
- Biologiczne
- Fizyczne
- Agrotechniczne

MONITORING I DIAGNOZA



- Obserwuj
- Identyfikuj
- Mierz
- Porównuj
- Zapisuj trend

PROFILAKTYKA



- Płodozmian
- Zdrowy materiał siewny
- Odpowiednia odmiana
- Higiena
- Optymalny termin siewu
- Zarządzanie resztkami
- Prawidłowe nawożenie
- Dobra kondycja gleby

Ważne!

Środki chemiczne nie są „złe”. To wartościowe, precyzyjne narzędzie, które – stosowane rozsądnie – pomaga chronić plony i stabilizować produkcję. Nie powinny jednak być pierwszym, automatycznym krokiem. Najlepsze efekty dają w połączeniu z innymi metodami, w ramach zintegrowanego programu ochrony.

Kluczowa zasada

Im szersza podstawa profilaktyki, tym większa szansa, że presja problemu pozostanie na poziomie możliwym do opanowania.

Przykład praktyczny: odporność chwastów na herbicydy

Problem odporności można ograniczać nie tylko przez zmianę herbicydu, ale także poprzez:

- zmianowanie roślin i różnicowanie sposobu uprawy,
- uprawki mechaniczne,
- zmianę terminu siewu,
- konkurencyjny, dobrze rozwinięty łan,
- zapobieganie produkcji nasion chwastów.



Pytanie kontrolne:

Dlaczego profilaktyka może zmniejszać presję na chemiczne środki ochrony roślin?

MODUŁ 07

Dobra strategia to nie dużo metod — to metody, które współpracują

Łączenie różnych narzędzi nie zawsze prowadzi do lepszych rezultatów. Metody powinny się uzupełniać, a nie wzajemnie znosić swoje korzyści.

Przykład 1 – Szkodniki

Jeśli w polu występuje silna populacja organizmów pożytecznych, stosowanie insektycydu o szerokim spektrum działania może ograniczyć zarówno szkodnika, jak i organizmy pożyteczne.



Efekt krótkoterminowy:
szybki spadek populacji.

Możliwy efekt później:
osłabienie naturalnej regulacji.

Przykład 2 – Choroby

Odmiana o wyższej odporności + odpowiedni płodozmian + monitoring pogody mogą ograniczyć presję chorób. Jeśli konieczny jest zabieg chemiczny, staje się on elementem bardziej precyzyjnego programu.



Mniejsza presja chorób i bardziej precyzyjne stosowanie ochrony chemicznej.

Przykład 3 – Chwasty

Sama rotacja mechanizmów działania herbicydów nie wystarczy, jeśli nic innego się nie zmienia. Najlepsze efekty daje połączenie wielu metod.

- Rotacja mechanizmów działania herbicydów
- Płodozmian
- Mechaniczne ograniczanie chwastów
- Zmiana terminów zabiegów
- Ograniczanie banku nasion w glebie
- Konkurencyjność łanu

ŚCIEŻKA A – dużo losowych działań

Wiele metod stosowanych bez planu → Konflikty między metodami → Niestabilny efekt

Przypadkowe łączenie metod może prowadzić do osłabienia skuteczności i nieprzewidywalnych rezultatów.

ŚCIEŻKA B – metody, które współpracują

Diagnoza sytuacji → Zgodne metody → Monitoring efektów → Korekta działań → Stabilniejsza ochrona

Przemyślane łączenie metod daje większą szansę na trwałe i stabilne ograniczenie agrofagów.

Szybka checklista decyzyjna

Pytanie	Co sprawdzić?
Czy metody mają ten sam cel?	Tak / Nie
Czy jedna metoda osłabia drugą?	Kompatybilność
Czy działamy we właściwym momencie?	Faza agrofaga i uprawy
Czy interwencja jest konieczna?	Monitoring / próg
Czy ograniczamy ryzyko na przyszłość?	Presja selekcyjna

Integracja to projektowanie systemu, a nie dokładanie kolejnych zabiegów.

Skuteczna ochrona to przemyślane łączenie metod, które wzajemnie się uzupełniają, są dostosowane do warunków gospodarstwa i ograniczają ryzyko na przyszłość.

Pytanie kontrolne:

Dlaczego dwa skuteczne narzędzia stosowane razem mogą czasem dać gorszy efekt niż jedno dobrze dobrane?

MODUŁ 07

Od objawu do decyzji — siedem pytań AgroClass

Zamiast reagować automatycznie na zauważony objaw, przejdź przez uporządkowaną sekwencję pytań. Taki sposób myślenia pozwala trafniej ocenić sytuację w polu i podjąć skuteczną, przemyślaną decyzję.

1 Co dokładnie widzę?

Objaw, uszkodzenie, organizm, lokalizacja, rozkład na polu.

Zwróć uwagę na szczegóły: kształt, kolor, wielkość, miejsce.



2 Czy znam sprawcę?

Określ, czy to chwast, patogen, szkodnik, niedobór pokarmowy czy stres środowiskowy.

Jeśli nie jesteś pewien – najpierw diagnoza, nie działanie.



3 Jak działa problem?

Ustal mechanizm szkód: konkurencja, infekcja, żerowanie, stres abiotyczny, zaburzenie żywienia.

Inny mechanizm – inne rozwiązanie.



4 Czy problem rośnie?

Porównaj obserwacje z kilku terminów. Czy zasięg i nasilenie się zwiększają?

Trendy są ważniejsze niż pojedyncza obserwacja.



5 Czy obecny poziom uzasadnia działanie?

Uwzględnij próg szkodliwości, fazę rośliny, tempo rozwoju problemu i warunki środowiska.

Nie każdy objaw wymaga natychmiastowej interwencji.



6 Jakie rozwiązanie najmniej zakłóci cały system?

Rozważ metody: profilaktyczne, biologiczne, mechaniczne, agrotechniczne, chemiczne.

Wybierz rozwiązanie skuteczne i możliwie najmniej uciążliwe dla środowiska oraz organizmów pożytecznych.



7 Czy działanie zadziałało?

Wróć w pole i oceń efekty. Porównaj z wcześniejszymi obserwacjami.

Skuteczność potwierdza monitoring, nie założenia.



WRÓĆ DO MONITORINGU

Każda decyzja to początek nowego cyklu obserwacji.

Dobra decyzja zaczyna się od właściwego pytania, nie od wyboru preparatu.

Studium przypadku

Ten sam objaw – dwa różne podejścia.

Podejście uproszczone (ryzykowne)



żółte liście → nawóz

Skutek: może nie rozwiązać problemu, może pogorszyć sytuację, wyższe koszty.

Lepsze podejście (oparte na pytaniach)

żółte liście
↓
gdzie? (na której części pola?)
↓
które liście? (starsze czy młodsze?)
↓
korzenie? (stan systemu korzeniowego)
↓
wilgotność? (za sucho / za mokro?)
↓
pH? (odczyn gleby)
↓
choroba? (objawy wtórne?)
↓
analiza (np. gleby lub rośliny)
↓
decyzja (dopasowana do przyczyny)

Skutek: trafna diagnoza, skuteczne działanie, mniejsze ryzyko, lepsza ochrona roślin i środowiska.

Pytanie kontrolne:

Który krok powinien pojawić się przed wyborem metody interwencji?

a) Czy problem rośnie?
b) Jak działa problem?
c) Czy znam sprawcę?

MODUŁ 07

Ochrona integrowana — myślenie systemowe w praktyce

Integrowana ochrona roślin (IPM) łączy wiedzę o organizmach, środowisku i metodach ochrony w spójny system, którego celem jest trwałe ograniczenie szkodliwości agrofagów przy minimalnym wpływie na środowisko.

AGROTECHNICZNE

Wykorzystują praktyki uprawowe i organizację produkcji do ograniczania agrofagów.

Przykłady:

- płodozmian i uprawa odmian odpornych,
- właściwy termin siewu,
- zróżnicowanie upraw,
- nawożenie i nawadnianie zgodne z potrzebami roślin.



BIOLOGICZNE

Wykorzystują organizmy pożyteczne i naturalne relacje biologiczne.

Przykłady:

- drapieżniki (np. biedronki, złotooki),
- pasożytoidy (np. błonkówki),
- mikroorganizmy (np. *Bacillus thuringiensis*),
- ochrona i tworzenie siedlisk dla organizmów pożytecznych.



PROCES INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN

PROFILAKTYKA
Twórz niekorzystne warunki dla agrofagów.

↓

MONITORING
Obserwuj pole i wykrywaj zagrożenia.

↓

IDENTYFIKACJA
Ustal gatunek i przyczynę problemu.

↓

OCENA RYZYKA
Oceń potencjalne straty i próg szkodliwości.

↓

DOBÓR METODY
Wybierz najbardziej odpowiednie narzędzia.

↓

INTERWENCJA
Zastosuj wybrane metody w odpowiednim momencie.

↓

OCENA EFEKTU
Sprawdź skuteczność działań.

↓

PONOWNY MONITORING
Kontynuuj obserwacje i podejmuj kolejne decyzje.

MECHANICZNE / FIZYCZNE

Wykorzystują czynniki fizyczne i mechaniczne do ograniczania agrofagów.

Przykłady:

- odłowy (pułapki, tablice lepowe),
- osłony (siatki, agrowłókniny),
- usuwanie i niszczenie porażonych części roślin,
- zabiegi mechaniczne (np. pielenie).



CHEMICZNE

Wykorzystują środki ochrony roślin w sposób przemyślany i odpowiedzialny.

Przykłady:

- selektywne środki o możliwie niskim wpływie na organizmy pożyteczne,
- stosowanie zgodnie z etykietą i progami szkodliwości,
- rotacja substancji czynnych,
- łączenie z innymi metodami ochrony.



6 rzeczy do zapamiętania:

1. Ochrona biologiczna wykorzystuje organizmy i relacje biologiczne do ograniczania agrofagów.
2. Skuteczność biologiczna silnie zależy od warunków środowiska i momentu zastosowania.
3. IPM zaczyna się od profilaktyki i monitoringu.
4. Interwencja powinna wynikać z diagnozy i oceny ryzyka.
5. Metody trzeba łączyć w sposób kompatybilny.
6. Każda decyzja powinna kończyć się ponowną oceną sytuacji.

Mini-test:

Sprawdź, czy dobrze zrozumiałeś najważniejsze zagadnienia z modułu. Wybierz jedną poprawną odpowiedź.

1. **Co jest podstawą piramidy IPM?**
   a) natychmiastowy zabieg b) profilaktyka c) najwyższa możliwa dawka
2. **Ochrona zachowawcza polega przede wszystkim na:**
   a) ochronie istniejących organizmów pożytecznych
   b) eliminacji wszystkich owadów c) rezygnacji z monitoringu
3. **Co powinno nastąpić po interwencji?**
   a) brak dalszych obserwacji b) ocena skuteczności i ponowny monitoring
   c) automatyczne powtórzenie zabiegu
4. **Czy integrowana ochrona wyklucza ochronę chemiczną?**
   a) tak b) nie — chemia może być jednym z uzasadnionych narzędzi

Odpowiedzi: 1b, 2a, 3b, 4b.

„Najlepszy specjalista nie zna tylko narzędzi. Wie, kiedy ich użyć, kiedy ich nie używać i jak sprawdzić efekt."

Słownik najważniejszych pojęć

Szybka karta powtórkowa najważniejszych pojęć z AgroClass.

ATP
cząsteczka wykorzystywana przez komórkę do przenoszenia energii między reakcjami.

Aparat szparkowy
struktura w skórce liścia regulująca wymianę gazową i utratę wody.

Chloroza
utrata lub zmniejszenie zielonego zabarwienia tkanki.

Chloroplast
organellum komórki roślinnej, w którym zachodzi fotosynteza.

Dyfuzja
spontaniczne przemieszczanie cząsteczek zgodnie z gradientem stężenia lub potencjału chemicznego.

Fitohormon
związek sygnałowy uczestniczący w regulacji wzrostu, rozwoju i reakcji rośliny.

Floem
tkanka przewodząca m.in. produkty fotosyntezy między organami rośliny.

Fotosynteza
proces wykorzystujący energię światła do tworzenia związków organicznych z udziałem CO_2 i wody.

Herbicyd systemiczny
herbicyd zdolny do przemieszczania się w roślinie po pobraniu.

Warto pamiętać!
Znajomość tych pojęć ułatwia zrozumienie procesów zachodzących w roślinach i podejmowanie trafnych decyzji w praktyce rolniczej.

IPM
integrowane zarządzanie agrofagami poprzez łączenie profilaktyki, monitoringu i różnych metod ochrony.

Ksylem
tkanka przewodząca wodę i składniki mineralne głównie z korzeni ku częściom nadziemnym.

Nekroza
obumarcie fragmentu tkanki.

Patogen
organizm lub czynnik biologiczny zdolny wywoływać chorobę.

Parazytoid
organizm rozwijający się kosztem pojedynczego gospodarza i prowadzący zwykle do jego śmierci.

Próg ekonomicznej szkodliwości
poziom wspierający decyzję o interwencji zanim straty osiągną poziom ekonomicznie istotny.

Selektywność
zdolność metody ochrony do działania na cel przy akceptowalnym bezpieczeństwie dla organizmu chronionego.

Stres abiotyczny
niekorzystny wpływ nieożywionego czynnika środowiska na funkcjonowanie rośliny.

Transpiracja
utrata wody w postaci pary z nadziemnych części rośliny.

Turgor
napięcie komórki wynikające m.in. z obecności wody.

MODUŁ 07

Roślina jako system – wszystko jest połączone

Roślina to zintegrowany organizm, w którym procesy fizjologiczne, środowisko i organizmy towarzyszące wzajemnie na siebie wpływają. Zrozumienie tych powiązań pozwala podejmować lepsze decyzje w ochronie i uprawie.

1 ŚWIATŁO

Napędza procesy życiowe rośliny.



- **Światło** (promieniowanie)
- **Fotosynteza** (w chloroplastach)
- **ATP / NADPH** (energia)
- **Asymilacja węgla** (CO_2 → cukry)
- **Wzrost** (więcej biomasy)

CO_2

KLUCZOWE POWIĄZANIE

WODA ↔ APARATY SZPARKOWE ↔ CO_2 ↔ FOTOSYNTEZA



3 WODA

Umożliwia transport i reguluje wymianę gazową.



- **Pobieranie wody** z gleby
- **Ksylem** (transport w górę)
- **Liść** (miejsce transpiracji)
- **Transpiracja** (wyparowywanie wody)
- **Aparaty szparkowe** (regulacja wymiany gazowej)

2 GLEBA

Podstawa odżywiania rośliny.



- **pH gleby**
- **Dostępność składników**
- **Korzeń** (pobieranie)
- **Odżywianie mineralne** (N, P, K, Ca, Mg....)

pH → DOSTĘPNOŚĆ SKŁADNIKÓW → METABOLIZM

4 HORMONY

Regulują wzrost, rozwój i reakcje na warunki środowiska.

- **Sygnał** (np. stres)
- **Hormony roślinne** (np. auksyny, ABA, etylen)
- **Wzrost** (podziały i wydłużanie komórek)
- **Rozwój** (np. kwitnienie, dojrzewanie)
- **Reakcje stresowe** (np. zamykanie aparatów)

STRES → HORMONY → ZMIANA WZROSTU i TRANSPIRACJI

Nie analizuj tylko pojedynczego objawu. Szukaj procesu, który łączy obserwację z całym systemem rośliny.

5 CHWASTY

Konkurują z rośliną uprawną o zasoby.

Konkurencja o:

- światło
- wodę
- składniki
- przestrzeń



CHWASTY → MNIEJ ZASOBÓW DLA UPRAWY

7 OCHRONA INTEGROWANA

Łączy wiedzę, monitoring i skuteczne działanie.

- **Profilaktyka**
- **Monitoring**
- **Diagnoza**
- **Celowana interwencja**

MONITORING → LEPSZA DECYZJA O OCHRONIE

6 PATOGENY I SZKODNIKI

Uszkadzają tkanki i zaburzają funkcjonowanie rośliny.

- **Atak** (np. owad, grzyb, bakteria, wirus)
- **Uszkodzenie tkanek** (np. liścia)
- **Spadek aktywnej powierzchni liści**
- **Zaburzenie fizjologii** (mniej fotosyntezy, słabszy wzrost)



USZKODZENIE LIŚCIA → MNIEJSZA POWIERZCHNIA FOTOSYNTETYCZNA

Warto pamiętać!

Objawy, które widzisz na roślinie, są wynikiem wielu powiązanych procesów.
Skuteczna ochrona i uprawa wymaga spojrzenia na cały system, a nie tylko na pojedynczy element.

MODUŁ 06–07

AgroClass Challenge — czy potrafisz połączyć fakty?

Wiedza w praktyce daje najlepsze plony!

Odpowiedz najpierw bez zaglądania do wcześniejszych stron. Potem wróć do materiału i sprawdź tok rozumowania.

1

Roślina doświadcza suszy. Aparaty szparkowe ograniczają otwarcie. Jakie dwa procesy zostają bezpośrednio połączone przez tę reakcję?

Sprawdź odpowiedź

Ograniczenie utraty wody oraz ograniczenie dopływu CO_2.

2

Analiza gleby pokazuje obecność fosforu, ale rośliny wykazują zaburzenia jego pobierania. Jakie czynniki warto sprawdzić przed zwiększeniem nawożenia?

Sprawdź odpowiedź

M.in. pH, wilgotność, temperaturę gleby, kondycję korzeni i formę dostępności składnika.

3

Po zabiegu chwasty nie wykazują natychmiastowej nekrozy, ale przestają rosnąć. Czy oznacza to automatycznie brak działania herbicydu?

Sprawdź odpowiedź

Nie — niektóre mechanizmy najpierw blokują proces metaboliczny lub wzrost, a widoczne objawy pojawiają się później.

4

Na liściach pojawiają się plamy po kilku dniach wilgotnej pogody. Dlaczego trzeba analizować pogodę sprzed pojawienia się objawów?

Sprawdź odpowiedź

Infekcja mogła rozpocząć się wcześniej, a objawy pojawiły się po okresie inkubacji.

5

Na polu znaleziono szkodnika, ale także dużą liczbę jego naturalnych wrogów. Jaka powinna być pierwsza reakcja?

Sprawdź odpowiedź

Monitoring, identyfikacja i ocena liczebności oraz trendu, a nie automatyczna interwencja.

6

Rolnik zmienia nazwę handlową herbicydu, ale substancje należą do tego samego mechanizmu działania. Czy znacząco zmniejsza presję selekcyjną na odporność?

Sprawdź odpowiedź

Niekoniecznie — kluczowa jest zmiana mechanizmu działania i integracja metod, a nie sama nazwą produktu.

7

Roślina ma żółte liście. Podaj cztery różne grupy przyczyn, które należy rozważyć.

Sprawdź odpowiedź

Np. niedobór składnika, choroba, problem wodny, uszkodzenie herbicydowe, problem korzeniowy, stres temperaturowy.

8

Dlaczego ochrona biologiczna nie powinna być oceniana wyłącznie na podstawie pytania: „Czy organizm pożyteczny został wprowadzony?”

Sprawdź odpowiedź

Trzeba również ocenić warunki, stadium celu, przeżywalność, kompatybilność i rzeczywisty wpływ na populację.

Jeżeli potrafisz odpowiedzieć na pytanie:

„Co widzę → dlaczego to się dzieje → co sprawdzić → kiedy działać?”

— zaczynasz myśleć jak diagnostyk, a nie tylko zapamiętywać informacje.

MODUŁ 08

Twój schemat pracy po AgroClass

Nie musisz pamiętać wszystkiego. Musisz wiedzieć, jak znaleźć właściwą odpowiedź.

1 ZATRZYMAJ SIĘ

Nie podejmuj decyzji tylko dlatego, że zauważyłeś objaw.

2 OPISZ

Zapisz: co widzisz, gdzie, na jakim organie, na ilu roślinach, w jakiej części pola.

3 SPRAWDŹ ROŚLINĘ

Oceń młode i stare liście, korzenie, łodygę, organy generatywne, dolną stronę liści.

4 SPRAWDŹ ŚRODOWISKO

Wilgotność gleby, temperaturę, opady, pH, strukturę gleby, historię nawożenia, historię zabiegów.

OBSERWUJ

↓

ZROZUM

↓

POŁĄCZ FAKTY

↓

ZDECYDUJ

↓

SPRAWDŹ EFEKT

5 OKREŚL PROCES

Czy problem dotyczy głównie fotosyntezy, odżywiania, gospodarki wodnej, chwastów, patogenu, szkodnika, czy stresu środowiskowego.

6 POTWIERDŹ DIAGNOZĘ

Połącz objaw + historia + warunki + rozkład + biologiczny mechanizm.

7 WYBIERZ DZIAŁANIE

Wybierz uzasadnione, ukierunkowane rozwiązanie, zgodne z aktualnymi zaleceniami i możliwie mało inwazyjne dla systemu.

8 WRÓĆ I SPRAWDŹ

Po interwencji odpowiedz:
Czy problem się zatrzymał?
Czy pojawiają się nowe objawy?
Czy założony efekt został osiągnięty?



Wiedza staje się praktyczna wtedy, gdy pomaga podjąć lepszą decyzję.

AgroClass — od mechanizmu do działania.

Lepsze decyzje dziś
to zdrowsze rośliny jutro.